

## 1과목 : 식물병리학

- 흰가루병균(白粉病菌)이 형성하는 포자의 종류는?
  - ① 자낭포자
  - ② 유주포자
  - ③ 담자포자
  - ④ 접합포자
- 벼 오갈병을 매개하는 곤충으로만 된 것은?
  - ① 벼멸구 - 애멸구
  - ② 애멸구 - 끝동매미충
  - ③ 진딧물 - 멸구류
  - ④ 끝동매미충 - 번개매미충
- 못자리나 기계이앙을 위한 상자 육묘에서 문제가 되는 벼의 병은 무엇인가?
  - ① 이삭누룩병
  - ② 탄저병
  - ③ 흰가루병
  - ④ 질록병
- 수박 덩굴쪼김병균의 월동처는 어디인가?
  - ① 매개곤충의 알
  - ② 토양
  - ③ 저장고
  - ④ 중간기주
- 유성세대가 없는 불완전균에서 일어나며 영양 균사에서 유성 생식과 같은 유전적인 재조합이 일어나는 현상을 무엇이라 하는가?
  - ① 접합
  - ② 형질전환
  - ③ 형질도입
  - ④ 준유성교환
- 다음 병 중 병원균이 이종기생하는 것은?
  - ① 배나무 붉은별무늬병
  - ② 배나무 검은별무늬병
  - ③ 배나무 화상병
  - ④ 사과나무 흰가루병
- 다음의 식물병 병원체 중 핵산으로만 구성되어 있으며 그 크기가 가장 작은 것은?
  - ① 바이러스(virus)
  - ② 바이로이드(viroid)
  - ③ 파이토플라스마(phytoplasma)
  - ④ 스피로플라스마(spiroplasma)
- 뽕나무 오갈병의 병원(病原)은?
  - ① 바이러스(virus)
  - ② 식물세균(plant bacteria)
  - ③ 진균(fungi)
  - ④ 파이토플라스마(phytoplasma)
- 벼 줄무늬잎마름병의 병원(病原)은?
  - ① 바이러스
  - ② 파이토플라스마
  - ③ 세균
  - ④ 진균
- 식물 파이토플라스마병의 증상으로 잘 나타나는 병징은?
  - ① 총생(도깨비집)
  - ② 괴저반점
  - ③ 모자이크
  - ④ 잎말림(권엽)
- 복숭아나무 잎오갈병의 전형적인 병징은?
  - ① 천공
  - ② 이상비대
  - ③ 위조
  - ④ 도장
- 배추에 모자이크 병징을 일으키는 바이러스에는 오이 모자이크 바이러스(CMV)와 순무 모자이크 바이러스(TUMV)가 있다. 이들의 전염 방식은?

- ① 총매 전염
- ② 토양 전염
- ③ 종자 전염
- ④ 꽃가루 전염

- 병원균의 새로운 레이스가 생길 때마다 저항성이 무너지는 경우에 해당하는 기주체의 저항성은?
  - ① 수직 저항성
  - ② 수평 저항성
  - ③ 레이스 비특이적 저항성
  - ④ 비기주 저항성
- 잎, 나뭇가지, 열매 등에 발생하고, 잎에는 검은색 작은 병무늬가 생기며 나중에 부정형이 되고 가지에는 타원형의 움푹한 흑갈색 병무늬가 생기며, 어린 열매는 딱딱해지고 쪼개지기도 하는 과수의 병은?
  - ① 배나무 붉은별무늬병
  - ② 배나무 검은별무늬병
  - ③ 배나무 검은무늬병
  - ④ 배나무 줄기마름병
- 모잘록병(Pythium)은 어떤 균류에 속하는가?
  - ① 자낭균류
  - ② 불완전균류
  - ③ 난균류
  - ④ 담자균류
- 생물학적 진단법이 잘 이용되지 않는 병은?
  - ① 벼 오갈병
  - ② 토마토 시들음병
  - ③ 사과나무 자주날개무늬병
  - ④ 벼 흰잎마름병
- 산성토양에서 더 많이 발생하는 병은?
  - ① 감자 더듬이병
  - ② 밀 마름병(Take-all)
  - ③ 배추 무사마귀병
  - ④ 목화 뿌리썩음병(Verticillium wilt)
- 식물의 병에 대한 화학적 저항성과 가장 관계가 먼 것은?
  - ① Tenuazonic acid
  - ② Protocatechuic acid
  - ③ Pathogenesis-related protein
  - ④ Hydroxyproline-rich glycoprotein
- 잎에만 발생하고 본 잎에서는 처음에는 수침상의 점무늬가 생기고 병무늬 가장자리가 잎맥으로 포위되어 있는 부정형 다각형의 담갈색 무늬로 발전하며 심하면 잎이 윗쪽으로 말리고, 습기가 많으면 병무늬 뒷면에 서리같은 가루모양의 흰색곰팡이가 생기는 병은?
  - ① 십자화과 작물의 모잘록병
  - ② 오이 노균병
  - ③ 토마토 역병
  - ④ 배추 무사마귀병
- Agrobacterium 에 의한 뿌리혹병의 생물적 방제에 사용되는 균은?
  - ① Agrobacterium tumefaciens
  - ② Agrobacterium rhizogens
  - ③ Agrobacterium citri
  - ④ Agrobacterium radiobacter

## 2과목 : 농림해충학

- 일반 경종법을 이용하여 해충을 방제하는 재배적 방제법의 설명 중 틀린 것은?
  - ① 예방적 조치이다.
  - ② 적은 경비로 목적을 달성할 수 있다.

- ③ 해충 문제를 완전히 해결할 수 있다.  
④ 저항성 해충 출현 등 부작용이 없다.
22. 다음 수종 중 솔잎혹파리 피해가 심한 수종은?  
① 잣나무                      ② 리기다소나무  
③ 곰솔(해송)                ④ 방크소나무
23. 곤충의 성페로몬에 관한 설명 중 잘못된 것은?  
① 극히 미량만 있어도 효력을 나타낸다.  
② 먼거리까지 작용을 한다.  
③ 한가지 성분으로만 되어 있다.  
④ 수컷이 성페로몬을 내는 종도 있다.
24. 유충이 몇 개의 버잎을 끌어모아 철하고 그 속에 숨어 있다가 해진 후에 나와 잎가부터 먹어 들어가 주맥만 남기는 해충은?  
① 줄점팔랑나비              ② 벼애나방  
③ 흑명나방                    ④ 버잎벌레
25. 벼메뚜기의 형태를 설명한 내용 중 틀리는 것은?  
① 겹눈은 난형으로 광택이 있는 회갈색이다.  
② 성충은 길이가 30-38mm이다.  
③ 알은 길이가 10mm인 긴타원형이고 황색이다.  
④ 몸은 황록색이며 머리와 가슴은 황갈색이다.
26. 진달래방패벌레는 어떤 총태로 월동하는가?  
① 번데기(용)로 월동한다.      ② 성충태로 월동한다.  
③ 알로 월동한다.                ④ 유충태로 월동한다.
27. 벌목의 잎벌과에 속하는 곤충의 촉각모양이 맞는 것은?  
① 곤봉모양                    ② 빗살모양  
③ 염주모양                    ④ 부채꼴 및 고리모양
28. 솔잎혹파리에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 1929년에 외국에서 처음 들어 왔다.  
② 유충은 솔잎을 밑부에서부터 갉아 먹는다.  
③ 1년에 1회 발생한다.  
④ 유충으로 땅속에서 월동한다.
29. 곤충의 4가지 기본환경 요인 중 온도에 대한 설명이다. 설명이 잘못된 것은?  
① 대부분의 곤충은 0 - 40℃가 생존범위 온도이다.  
② 발육 영점온도 이상의 유효 온도의 합이 일정량에 도달될 때 발육이 끝나는 성질이 있다.  
③ 월동 중의 곤충들은 조직내에 글리세롤(glycerol)과 같은 동해방어 물질이 생성된다.  
④ 발육 영점온도는 일반적으로 4℃ 정도이다.
30. 총채벌레목에 관한 설명 중 틀린 것은?  
① 단위생식도 한다.  
② 입틀의 좌우가 같다.  
③ 왼쪽 큰턱이 한개만 발달하였다.  
④ 불완전 변태를 한다.
31. 다음 중 천적 방제의 성공 사례가 아닌 것은?

- ① 미국흰불나방 - 고치벌  
② 이세리아 각지벌레 - 베달리아 무당벌레  
③ 루비각지벌레 - 루비각지좀벌  
④ 사과면충 - 사과면충좀벌
32. 버벌구에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 비래 해충이다.  
② 주로 벼에 큰 피해를 준다.  
③ 줄무늬잎마름병을 매개한다.  
④ 성충은 장시형과 단시형이 있다.
33. 이화명나방의 가해특성 중 올바른 것은?  
① 버줄기 속에는 단지 1마리의 유충만 있다.  
② 한 마리의 유충이 여러 개의 버줄기를 가해한다.  
③ 앞집이 말라 죽어도 부러지지는 않는다.  
④ 피해줄기 속에 배설물은 차 있지 않다.
34. 배추벼룩잎벌레에 대한 설명 중 옳은 것은?  
① 고추의 가장 대표적인 해충이다.  
② 성충이 뿌리를 가해한다.  
③ 일반적으로 작물이 어린 시기에 피해가 많다.  
④ 번데기로 월동한다.
35. 통계적 예찰법에서 예찰식을 계산할 때 주의사항으로 틀린 것은?  
① 변동량이 극단적인 경우는 제외한다.  
② 예측범위를 통계자료의 범위내로 한다.  
③ 이상발생이나 대발생 예찰에 적용한다.  
④ 상관관계의 유의성을 충분히 고려한다.
36. 배추흰나비가 십자화과 채소에 알을 낳는 것은?  
① 주광성                      ② 주화성  
③ 주수성                      ④ 주촉성
37. 유효적산온도 법칙에 대한 설명 중 잘못된 것은?  
① 발육영점온도 이상의 온도만 관련된다.  
② 유효적산온도는 종에 따라 다르다.  
③ 유효적산온도는 세대에 따라 다를 수 있다.  
④ 발육영점온도는 최저생존허용온도보다 높다.
38. 다음 중 토양해충인 것은?  
① 송장벌레                    ② 바퀴  
③ 개미                        ④ 땅강아지
39. 메뚜기 큰턱의 운동을 지배하는 신경의 중추는 다음 중 어느 것인가?  
① 식도하 신경절              ② 제3대뇌  
③ 후대뇌                      ④ 전대뇌
40. 곤충의 혈림프로 방출되는 탄수화물의 저장대는 무엇인가?  
① 글리코겐                    ② 무코다당류  
③ 키틴                        ④ 트레할로스

**3과목 : 재배학원론**

41. 벼의 추락현상이 발생할 때 벼뿌리를 상하게 하는 주된 물질은?  
 ① 황화수소                      ② 탄산가스  
 ③ 불화수소                      ④ 메탄가스
42. 중경(中耕) 효과가 아닌 것은?  
 ① 토양중으로 산소 투입효과      ② 유해가스의 방출  
 ③ 잡초방제                      ④ 병충해 방제
43. 토양선충의 소독제는?  
 ① Vapam                      ② EPN  
 ③ 밧사                      ④ PCNB
44. 광부족에 적응성이 가장 약한 작물은?  
 ① 당근                      ② 강낭콩  
 ③ 딸기                      ④ 감자
45. 다음의 작물에서 요수량(要水量)이 가장 적은 작물은?  
 ① 수수                      ② 메밀  
 ③ 밀                      ④ 보리
46. 단교잡(單交雜 : Single-cross)의 장점과 단점은?  
 ① 잡종강세가 발현되나 종자생산이 적다.  
 ② 균일성이 발현되나 종자생산이 없다.  
 ③ 종자생산은 극히 많으나 균일성이 저하된다.  
 ④ 수량이 많으나 병해에 약하다.
47. 윤작(輪作)의 원리에 알맞지 않은 것은?  
 ① 주작물(主作物)은 지역사정에 따라서 다양하게 변하고 있음  
 ② 식량작물(食糧作物)이나 사료작물(飼料作物) 생산의 어느 한쪽에 치중함  
 ③ 지력유지를 위하여 공과작물이나 다비성작물(多肥性作物)이 반드시 포함됨  
 ④ 잡초의 경감을 위해서 중경작물(中耕作物)이나 피복작물(被服作物)이 포함됨
48. 여름작물이 냉온(冷溫)을 만나면 나타나는 현상으로 볼 수 없는 것은?  
 ① 질소, 인산, 칼륨, 규산 등의 양분흡수장애  
 ② 물질의 동화전류의 증가  
 ③ 호흡의 감퇴  
 ④ 질소동화가 저해되어 암모니아의 축적이 많아짐
49. 피자식물이 가지는 중복수정에서 염색체의 조성은?  
 ① 배 n, 배유 n                      ② 배 n, 배유 2n  
 ③ 배 2n, 배유 3n                      ④ 배 2n, 배유 2n
50. 종자의 수명(壽命)에 가장 영향을 적게 미치는 조건은?  
 ① 종자의 수분함량      ② 저장습도(貯藏濕度)  
 ③ 저장온도(貯藏溫度)      ④ 광선(光線)
51. 홍미(紅美)는 어느 작물의 품종명인가?  
 ① 고구마                      ② 감자

- ③ 땅콩                      ④ 유채

52. 일대교잡종(一代交雜種)을 많이 이용하는 작물은?  
 ① 벼                      ② 콩  
 ③ 보리                      ④ 옥수수
53. 포도의 무핵과 형성에 이용되는 생장조절제는?  
 ① Gibberellin                      ② B-995  
 ③ CCC                      ④ MH-30
54. 토양중에 산소가 부족하고 CO<sub>2</sub> 농도가 높을 때 가장 흡수가 곤란한 성분은?  
 ① N                      ② P  
 ③ K                      ④ Ca
55. 유전적으로 고정된 품종이라도 그 내병성이 시일이 경과함에 따라 비교적 쉽게 변동하는 가장 기본적인 원인은?  
 ① 내병성의 생리적 요인이 변화하기 때문  
 ② 침해병원체의 계통이 변화하기 때문  
 ③ 기상환경이 변화하기 때문  
 ④ 재배법이 변화하기 때문
56. 작물생육에 영양원이 되는 무기성분 중 미량원소로만 묶여진 것은?  
 ① 철, 망간, 붕소                      ② 칼슘, 마그네슘, 붕소  
 ③ 몰리브덴, 인, 칼슘                      ④ 질소, 망간, 붕소
57. 일반적으로 작물에 많이 이용되고 있는 토양수분은 어느 것인가?  
 ① 모관수                      ② 결합수  
 ③ 중력수                      ④ 흡착수
58. 작물이나 과수에 순지르기의 영향이 아닌 것은?  
 ① 생장을 억제시킨다.  
 ② 측지(側枝)의 발생을 많게 한다.  
 ③ 개화나 착과(着果)수를 적게 한다.  
 ④ 목화나 두류에서도 효과가 크다.

59. 밭에서 한발 경감대책으로 적당하지 못한 것은?  
 ① 뿌림골을 낮게 한다.                      ② 뿌림골을 넓게 한다.  
 ③ 퇴비를 증시한다.                      ④ 칼륨을 증시한다.

60. 동상해의 응급대책으로 보온효과가 가장 큰 것은?  
 ① 발연법                      ② 연소법  
 ③ 송풍법                      ④ 살수빙결법


**4과목 : 농약학**

61. 제충국의 유효성분은?  
 ① rotenone                      ② pyrethrin  
 ③ pyrethrolone                      ④ allethrin
62. 농약의 독성을 표시하는 것은?  
 ① 잔류허용량                      ② 안전사용기준  
 ③ 중위치사량                      ④ 1일 섭취허용량

63. 협력제(synergists)의 구조는?  
 ① dichlorophenyl      ② phthalylphenyl  
 ③ dioxyphenyl      ④ methylene dioxyphenyl
64. 비선택성 제초제로 분류되는 농약은?  
 ① 마세트      ② 데브리놀  
 ③ 씨마진      ④ 글라신
65. 다음 농약 성분 중 저투입 고효율성 약제는?  
 ① Pyrazosulfuron-ethyl      ② Napropamide  
 ③ Alachlor      ④ Pendimethalin
66. 유기합성 살충제에 속하지 않는 농약은?  
 ① 유기인계      ② 설폰닐우레아계  
 ③ 카바메이트계      ④ 유기염소계
67. 농약의 용제로서 갖추어야 될 요인으로 옳지 않은 것은?  
 ① 농약에 대한 용해도가 커야한다.  
 ② 농약의 약효 및 안전성을 저하시켜서는 안된다.  
 ③ 농약의 독성을 증대시켜야 한다.  
 ④ 용제 자신이 약해를 내서는 안된다.
68. 농약의 안전성 평가항목 중 일반독성 평가항목에 해당되지 않는 것은?  
 ① 변이원성      ② 만성독성  
 ③ 신경독성      ④ 어독성
69. 주로 원제가 가수분해나 열에 안정한 화합물에 한하여 적용하고 있는 입제의 제제 방법은?  
 ① 압출조립법      ② 흡착법  
 ③ 피복법      ④ 분무건조법
70. 수화제에 많이 쓰이는 증량제는?  
 ① toluene      ② sulfamate  
 ③ bentonite      ④ methanol
71. 농약의 작용기구 규명에 추적자(Tracer)로 쓰이는 방사성 동위원소 중 반감기가 가장 긴 핵종은?  
 ①  $C^{14}$       ②  $P^{32}$   
 ③  $S^{35}$       ④  $Hg^{203}$
72. 응애류의 방제 약제인 살비제가 아닌 것은?  
 ① Dicofol(kelthane)      ② Propargite(progi)  
 ③ Tetradifon(tedion)      ④ Cinosulfuron(setoft)
73. 독성(毒性)의 정도를 표시하는데 쓰이지 않는 것은?  
 ①  $LC_{50}$       ②  $LD_{50}$   
 ③  $ED_{50}$       ④ HLB
74. 유제나 수화제의 살포액 조제 시 고려하지 않아도 될 사항은?  
 ① 알칼리용수나 오염된 물은 약해를 유발시키므로 농약의 희석용수로는 부적당하다.  
 ② 간척지에서 바닷물을 사용 시에는 농약의 주성분 분해가 일어나 약효가 떨어진다.

- ③ 소정의 희석배수를 엄수한다.  
 ④ 약제가 균일하게 섞이도록 충분히 혼합한다.

75. 유기 인화합물을 5가의 P원자를 가진 인산에스테르류가 주된 것으로 5종의 기본형으로 분류된다. 여기에서 포스포로아미데이트(phosphoroamidate)형은?



76. 수질 오염성 농약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 수서 생물에 피해를 일으킬 우려가 있는 농약이다.  
 ② 수질 환경 보건법과 관련이 있다.  
 ③ 공공수역의 수질을 오염시켜 사람에게 피해를 줄 우려가 있는 농약이다.  
 ④ 땅 속의 생물이나 가축 등의 피해와는 무관하다.

77. 우리 나라에서 분제로 가장 많이 사용되는 증량제는?  
 ① 벤토나이트      ② 탈크  
 ③ 필로필라이트      ④ 카오린

78. 농약의 일일 섭취 허용량을 기술한 것 중 옳은 것은?  
 ① 농약을 함유한 음식을 하루 섭취하여도 장해가 없는 량  
 ② 농약을 함유한 음식을 일년간 섭취하여도 장해가 없는 량  
 ③ 농약을 함유한 음식을 십년간 섭취하여도 장해가 없는 량  
 ④ 농약을 함유한 음식을 일생 동안 섭취하여도 장해가 없는 량

79. 증량제가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?  
 ① 가급적 중성의 것을 택하도록 하여야 함  
 ② 비중이 너무 크거나 작으면 안됨  
 ③ 증량제는 흡습성이 있어야 함  
 ④ 증량제는 저장 중 주제에 작용해서 분해되는 성질을 가지면 안됨

80. 농약의 살포액 조제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 전착제는 가용할 때 물에 잘 녹인 후 사용하는 것이 좋다.  
 ② 수화제는 소요량의 수화제와 소량의 물을 작은그릇에 넣고 저은 다음 다시 소요량의 물을 부어 사용한다.  
 ③ 유제의 원액에 침전물이 있을 때에는 따뜻한 물을 가하여 침전물이 없어진 다음에 조제한다.  
 ④ 농약살포액조제 시 원액이 잘 용해되기 위하여 사용하는 물은 온도가 높은 것이 좋다.

#### 5과목 : 잡초방제학

81. 예방적 잡초방제와 관련이 없는 것은?  
 ① 파종전 작물 종자에 섞여있는 잡초종자를 철저히 제거한다.  
 ② 잡초의 발생에 불리한 제한 관개와 제한 경운을 실시한다.

- ③ 농기계와 기구에 붙어있는 잡초종자를 깨끗이 청소 한다.  
④ 퇴비는 미부숙 상태로 사용한다.
82. 종자 휴면의 원인이 될수 없는 것은?  
① 종피의 불투기성      ② 생장조절물질의 과다  
③ 배의 미숙      ④ 종피의 기계적 저항
83. 작물과 잡초와의 경합요인이 될 수 없는 것은?  
① 영양분      ② 수분  
③ 광선      ④ 성숙기
84. 겨울잡초만으로 짝지워진 것은?  
① 냉이, 독새풀, 피  
② 점나도나물, 벼룩이자리, 벼룩나물  
③ 독새풀, 비름, 별꽃아재비  
④ 벼룩나물, 냉이, 쇠비름
85. 작물과 잡초와의 경합해(競合害)로 나타나는 작물의 증상은?  
① 작물의 엽면적이 커진다.  
② 광합성량(光合成量)이 줄어든다.  
③ 건물중(乾物重)은 많아진다.  
④ 분얼수도 많아진다.
86. 식물 표면에서 제초제의 흡수 과정과 관련된 설명 중 틀린 것은?  
① 비극성(친유성) 제초제는 큐티클 납질층을 친수성보다 잘 통과한다.  
② 친수성 제초제의 통과는 펙틴이 높고 다음이 큐틴이며 납질은 통과가 어렵다.  
③ 셀룰로오스층은 촘촘하여 비극성 및 극성 제초제 모두 투과가 어렵다.  
④ 계면활성제는 극성 제초제가 큐티클 납질층을 잘 통과하도록 도와준다.
87. 잡초의 전파 방법 중 사람이나 동물에 부착하여 운반되는 잡초는?  
① 민들레      ② 소리쟁이  
③ 도꼬마리      ④ 여뀌
88. 아래 보기 중 잡초방제방법의 발달 순서로 맞는 것은?
- ① 축력  
② 기계적 방제  
③ 선택적 제초제 개발  
④ 종합적 방제
- ① ① → ② → ③ → ④      ② ① → ② → ④ → ③  
③ ① → ③ → ② → ④      ④ ② → ① → ③ → ④
89. 화학방제법에 대한 생물적 방제법의 장점 중 잘못된것은?  
① 방제비용이 적게 든다.  
② 잔류오염의 염려가 없다.  
③ 처리가 용이하다.  
④ 방제효과가 빨리 나타난다.

90. 다음 제형 중 수용성이 아닌 원제를 아주 작은 입자로 미분화시킨 분말로서 물에 분산시켜 사용하는 것은?  
① 수화제      ② 수용제  
③ 유제      ④ 입제
91. 다음 중 논에 사용하는 것이 부적당한 제초제는?  
① 부타벤설입제      ② 이사디액제  
③ 옥사존유제      ④ 알라유제
92. 작물 파종 후 초관형성기까지는 잡초와의 경합으로 인해 작물 생육에 영향이 큰 시기로 이 시기를 무엇이라고 하는가?  
① 잡초경합허용기간      ② 잡초경합한계기간  
③ 잡초경합이용기간      ④ 잡초경합최대기간
93. 논 제초제의 약해 발생요인이 아닌 것은?  
① 건묘이식      ② 이앙심도가 얇은 경우  
③ 연약한 도장묘      ④ 과잉살포
94. 농경지 잡초를 가장 잘 설명한 것은?  
① 농경지나 야생상태에 발생하는 모든 잡초  
② 논에만 발생하는 잡초  
③ 일반잡초와는 달리 농경지에만 적응하여 발생하는 잡초  
④ 밭이나 야생상태에 발생하는 잡초
95. 식물체내에서 일어나는 제초제 분해반응 중 맞지 않는 것은?  
① 인산화 반응(phosphorylation)  
② 히드록시 반응(hydroxylation)  
③ 탈카르복시 반응(decarboxylation)  
④ 탈알킬 반응(dealkylation)
96. 생육억제물질에 의한 잡초 종자의 휴면을 타파하는 방법이 아닌 것은?  
① 저온습윤 처리      ② 번온 처리  
③ 생장촉진제 사용      ④ 황산 처리
97. 외국에서 유입된 대표적인 외래잡초로만 구성되어 있는 것은 어느 것인가?  
① 올챙이고랭이, 미국자리공, 생이가래  
② 미국개기장, 단풍잎돼지풀, 서양민들레  
③ 서양민들레, 올방개, 방동사니  
④ 단풍잎돼지풀, 미국가막사리, 중대가리풀
98. 다음 중 논 다년생잡초로만 묶여 있는 것은?  
① 물피, 알방동사니, 사마귀풀  
② 참방동사니, 하늘지기, 중대가리풀  
③ 나도겨풀, 올방개, 가래  
④ 한련초, 생이가래, 큰고추풀
99. 농업에 잡초가 존재하는 이유를 설명한 것 중 잘못된것은?  
① 가벼운 종자를 다량 생산하기 때문이다.  
② 불량한 환경조건에 적응력이 높기 때문이다.  
③ 번식 능력이 높고 다양하기 때문이다.  
④ 휴면성이 결여되어 있기 때문이다.

100. 작물과 잡초의 경합 중 양분경합에서 수량에 가장 크게 관여하는 비료성분은?

- ① 마그네슘(Mg)      ② 질소(N)  
③ 인산(P)          ④ 칼륨(K)

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	②	④	①	②	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	③	③	②	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	①	③	②	③	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	③	②	④	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	①	①	②	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	②	①	①	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	④	①	②	③	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	②	③	④	②	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	④	②	②	③	③	①	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	③	①	④	②	③	④	②