

1과목 : 가축육종학

- Yorkshire 종과 Berkshire 종 돼지를 교배할 때 F2에 있어 흑색 돼지가 나타나는 비율은?
① 1/4 ② 2/4
③ 3/4 ④ 4/4
- 선발차를 형질의 표현형 표준편차로 나눈 것은?
① 선발지수 ② 선발반응
③ 선발방법 ④ 선발강도
- 다음 중 비대립 유전자 간의 상호작용이 아닌 것은?
① 억제유전자 ② 복대립유전자
③ 상위유전자 ④ 동의유전자
- 가축의 양적형질은 어떤 변이에 속하는가?
① 유전적 변이 ② 환경적 변이
③ 연속적 변이 ④ 불연속적 변이
- 연관(linkage)과 교차(crossing over)의 설명이 옳은 것은?
① 연관과 교차는 규칙적인 유전법칙을 갖는다.
② 연관된 유전자 간에는 교차가 잘 일어나지 않는다.
③ 연관된 유전자 간에는 교차가 잘 일어난다.
④ 연관과 교차는 무관하다.
- 젖소의 주요 경제형질인 산유량과 유지율 개량을 위한 수컷의 선발에 이용이 불가능한 검정방법은?
① 후대검정 ② 가계선발
③ 능력검정 ④ 자매검정
- 산란용 닭의 선발 요건으로 가장 거리가 먼 것은?
① 산란을 많이 할 것 ② 체중이 무거운 것
③ 난중이 무거운 것 ④ 사료 소비량이 적은 것
- 닭에 있어서 완두관과 장미관을 교배하면 호두관이 되는 것은 어느 유전자의 작용으로 발현되는 것인가?
① 변경유전자 ② 상위유전자
③ 보족유전자 ④ 억제유전자
- 다음 형질 중 간역형질(threshold character)에 해당하는 것으로 가장 적합한 것은?
① 성비(sex ratio) ② 사료 이용성
③ 비유능력 ④ 닭의 황반 무모색
- 돼지의 품종 중 산자수가 많고, 비유능력이 양호하며 새끼 돼지를 잘 키우는 품종은?
① Berkshire 종 ② Hampshire 종
③ Landrace 종 ④ Duroc 종
- 원형질과 함께 완전한 생활기능을 발휘하고 진화에 응하는 최소한도의 염색체 수의 1벌을 의미하는 것은?
① DNA ② RNA
③ Polydactyl ④ Genome
- 다음 중 RNA에만 존재하는 질소 염기는?

- ① Uracil ② Adenine
③ Guanine ④ Thymine

- 다음 젖소의 경제형질 중 유전력이 가장 낮은 것은?
① 수태율 ② 유량
③ 일당증체량 ④ 유지방함량
- 어느 종돈 군에서 154일령 체중에 대하여 선발된 암퇘지와 수퇘지의 선발차가 각각 4kg과 6kg이고, 이때의 유전력이 20%라면 유전적 개량량은 얼마인가?
① 0.6kg ② 0.8kg
③ 1.0kg ④ 1.2kg
- 부모 A와 B가 서로 반형매(half-sib)일 때 이들에게서 태어난 자손의 근친도는?
① 5% ② 12.5%
③ 25% ④ 50%
- 일반적으로 가축의 생산능력이 떨어지는 근친교배를 실시하는 이유로서 틀린 것은?
① 특정 유전자의 고정
② 불량한 열성 유전자의 제거
③ 근친 계통간의 잡종 강세 이용
④ 이형 1 접합체의 증가
- 육우의 교잡 목적으로 부적합한 것은?
① 번식능력, 생존율, 초기성장 등에서 잡종강세를 이용하기 위하여
② 품종간 상보효과(complementation)를 이용하기 위하여
③ 강력유전현상(prepotency)을 이용하기 위하여
④ 새로운 유전인자를 도입하여 유전적 변이를 크게 하기 위하여
- 돼지의 등지방 두께에 대한 유전력은 0.5로 고도의 유전력을 나타내고 있다. 이와 같이 유전력이 높은 형질을 개량하는 데 있어 가장 좋은 선발 방법은?
① 개체 선발 ② 혈통 선발
③ 형매 검정 ④ 후대 검정

- 다음의 염색체 이상 현상 가운데 성격이 다른 것은?
① 중복현상(duplication) ② 이수현상(aneuploidy)
③ 역위현상(inversion) ④ 전좌현상(translocation)

- 다음 중 당대검정우의 구비 조건에 해당되지 않는 것은?
① 종빈우에서 태어나고 생후 160일령 이전에 이유한 수송아지일 것
② 등록기관에 혈통등록이상으로 등록되어서 혈액형검사결과 친자가 확인된 것
③ 외모심사 평점이 60점 이상일 것
④ 생후 180일령 체중이 150kg 이상일 것

2과목 : 가축번식생리학

- 다음 중 성(性)성숙에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?
① 계절 ② 온도
③ 영양 ④ 바람

22. 성선(性腺)에서 분비되는 호르몬 중 스테로이드 호르몬이 아닌 것은?

- ① testosterone ② relaxine
③ estrogen ④ progesterone

23. 소의 수정란 이식에 있어서 다배란 유기 방법 중 틀린 것은?

- ① FSH를 사용한다. ② PMSG를 사용한다.
③ PGF2α를 사용한다. ④ 에스트로겐을 사용한다.

24. 소에서 정자가 정소상체를 통과하는데 필요한 시간은?

- ① 10일 ② 15일
③ 20일 ④ 25일

25. 정상적인 돼지에 있어 배란이 일어나는 시기로 가장 적합한 것은?

- ① 발정개시 직후 ② 발정을 개시 36~44시간 후
③ 발정이 끝났을 무렵 ④ 발정이 끝난 지 24시간 후

26. 가축 인공수정의 장점 설명으로 옳은 것은?

- ① 가축의 개량에 큰 효과가 있다.
② 숙련된 기술자가 아니라도 수태율에는 이상이 없다.
③ 종모축의 선택에 관계없이 능력 개량이 가능하다.
④ 정자의 보관은 어디에나 장기간 가능하기 때문에 편리하다.

27. 다음 중 수정란이식의 장점은?

- ① 종모축의 이용률을 증대시켜 가축의 능력을 개량할 수 있다.
② 종모축의 사양관리의 부담이 경감된다.
③ 종모축의 유전능력을 조기에 판단할 수 있다.
④ 종빈이 보유하고 있는 난자를 최대로 활용할 수 있다.

28. 다음 중 젖소에서 편리하게 사용할 수 있는 호르몬 분석에 의한 임신 진단법은?

- ① 자궁경관 점액 검사법
② 직장 검사법
③ 우유 중의 프로게스테론 측정법
④ 우유 중의 에스트로겐 측정법

29. 유선에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유선의 발생학적 원기는 내배엽이다.
② 유즙을 분비하는 기본 구조는 유선포이다.
③ 유선에서 비유가 개시되는 데는 프로락틴(prolactin)의 역할이 가장 중요하다.
④ 유선의 조직학적 구조는 복합 관상 포상선으로 되어 있다.

30. 다음 중 쌍각자궁(Bicornuate uterus)의 형태를 가진 가축은?

- ① 소 ② 돼지
③ 토끼 ④ 산양

31. 젖소의 성성숙 월령으로 가장 적합한 것은?

- ① 8~13개월 ② 15~20개월

③ 22~27개월

④ 29~34개월

32. 다음 암소 중 성성숙이 가장 느린 품종은?

- ① Ayrshire ② Holstein
③ Guernsey ④ Jersey

33. 다음 정액채취방법 중 소에서 가장 많이 사용하는 이상적인 방법은?

- ① 전기자극법 ② 맛사지법
③ 인공질법 ④ 콘돔법

34. 난소의 기능 이상으로 나타나는 번식장애가 아닌 것은?

- ① 무발정 ② 이형발정
③ 배란장애 ④ 수정장애

35. 다음 중 소의 평균 발정지속 시간으로 가장 적합한 것은?

- ① 15~18시간 ② 30~32시간
③ 50~55시간 ④ 7일

36. 포유동물에서 정자의 완성과정을 4단계로 나눌 수 있는데, 그 순서를 올바르게 나열한 것은?

- ① 두모기 - 골지기 - 첨체기 - 성숙기
② 골지기 - 두모기 - 첨체기 - 성숙기
③ 두모기 - 첨체기 - 골지기 - 성숙기
④ 골지기 - 첨체기 - 두모기 - 성숙기

37. 성선자극호르몬인 FSH와 LH의 생리작용과 유사한 작용을 하는 태반호르몬들을 서로 바르게 연결한 것은?

- ① FSH - GnRH, LH - HCG
② FSH - PMSG, LH - GnRH
③ FSH - PMSG, LH - HCG
④ FSH - HCG, LH - PMSG

38. 사출된 정액에 들어있는 정자의 생존성과 운동성에 결정적인 영향을 미치는 요인에 속하지 않는 것은?

- ① 습도, 계절 ② 전해질, 온도
③ 산소량, 광선 ④ pH, 삼투압

39. 다음 중 젖소의 적당한 건유 기간은?

- ① 약 40일 ② 약 50일
③ 약 60일 ④ 약 70일

40. 젖소의 유선포 상파세포에서 분비된 유즙의 이동경로로 옳은 것은?

- ① 유선포 → 유선엽 → 유선관 → 유두조 → 유두관
② 유선포 → 유선조 → 유선관 → 유두조 → 유두관
③ 유선포 → 유선엽 → 유선조 → 유두조 → 유두관
④ 유선포 → 유선관 → 유선엽 → 유두조 → 유두관

3과목 : 가축사양학

41. 포도당과 갈락토오스가 각각 1분자씩 결합된 것으로서 포유동물의 젖 속에 들어 있는 것은?

- ① 서당(Sucrose) ② 맥아당(Maltose)
③ 유당(Lactose) ④ 과당(Fructose)

42. 질소 함량이 2% 되는 사료의 조단백질 함량으로 가장 적합한 것은?
 ① 6.25% ② 8.25%
 ③ 10.25% ④ 12.50%
43. 건초의 안전한 저장을 위해서 수분함량은 몇 % 이하여야 하는가?
 ① 35% ② 25%
 ③ 20% ④ 15%
44. 사료 내 각종 영양소 중 Methionine과 Choline의 체내에서의 공통된 작용은?
 ① 유효 Methyl기 공급 ② Sulfur 공급
 ③ 면역 항체의 합성 ④ 각기병 예방
45. 이상(異常)돼지고기는 근육이상, 체지방 이상 및 기타 고기 품질이상 형태를 말하는데, 다음 중 근육 이상 돼지고기가 아닌 것은?
 ① PSE ② 백근증
 ③ DFD ④ 황돈육
46. 비유중인 젖소의 체유지를 위한 정비에너지 요구량을 계산하는 공식 중 옳은 것은?
 ① $70 W^{0.75}$ ② $75 W^{0.75}$
 ③ $80 W^{0.75}$ ④ $85 W^{0.75}$
47. 불포화지방산 가운데 2중 결합의 수가 3개인 지방산은?
 ① 스테아린산(Stearic acid)
 ② 팔미틴산(Palmitic acid)
 ③ 리놀레닌산(linolenic acid)
 ④ 리놀레인산(Linoleic acid)
48. 비유 젖소의 배합사료를 가공하는 방법 중 이용효율이 가장 높은 방법은?
 ① 수침(Soacking) ② 볶기(Roasting)
 ③ 튀기기(Popping) ④ 박편처리(Flaking)
49. 가축 체내의 축적지방의 주 형태는?
 ① monoglyceride ② diglyceride
 ③ triglyceride ④ free fatty acid
50. 다음 중 근괴사료에 속하는 것은?
 ① 타피오카 ② 캐놀라 밀
 ③ 옥수수 글루텐 ④ 채종박
51. 거세우에게 저에너지 사료(L), 중에너지 사료(M) 및 고에너지 사료(H)를 90일 동안 각각 급여했을 때 도체의 최종 체지방함량을 가장 높이는 급여방법은?
 ① L - L - L ② L - L - H
 ③ H - M - L ④ H - H - H
52. 유지율을 높이는 효과가 있는 것은?
 ① 아세트산(acetic acid) ② 프로피온산(propionic acid)
 ③ 낙산(butyric acid) ④ 젖산(lactic acid)

53. 벣짚을 알칼리 처리할 때 기대할 수 있는 가장 큰 효과는?
 ① 벣짚 중 섬유소의 소화율이 향상된다.
 ② 벣짚 중 비타민 B군 합성량이 증가한다.
 ③ 벣짚 중 미량광물질 함량이 증가한다.
 ④ 벣짚에 납두균이 증가한다.
54. 일반적으로 도체등급과 경제성을 고려한 비육우의 사육방법으로 가장 적당한 것은?
 ① 조사료로 육성 및 비육
 ② 조사료로 육성 후 농후사료로 비육
 ③ 농후사료로 육성 후 조사료로 비육
 ④ 농후사료로만 육성 및 비육
55. 수용성 비타민 중에는 주로 영양소의 대사과정에서 조효소(coenzyme)로 관여하는 비타민이 많은데 다음 중 이 기능과 관계가 없는 비타민은?
 ① 티아민 ② 리보플라빈
 ③ 토코페롤 ④ 판토텐산
56. 단백질효율(PER)을 바르게 표시한 것은?

섭취한질소 - (분질소 + 요질소)

① 섭취한질소 - 분질소

- ② 축적된질소량/섭취한질소량
 ③ 중체량(g)/단백질섭취량(g)
 ④ 생물가 × 소화율(%)
57. 사료첨가용 요소(N : 45%) 30ton이 있다면 단백질량으로 환산할 때 대두박(단백질 : 44%) 몇 ton에 해당하는가?
 ① 약 31 ton ② 약 84 ton
 ③ 약 192 ton ④ 약 371 ton
58. 점간점진법은 산란계의 산란율을 증가시키기 위해 최대 얼마까지의 점등시간을 연장해 점당관리를 하는가?
 ① 15시간 ② 17시간
 ③ 19시간 ④ 21시간
59. 다음 중 필수 아미노산이 아닌 것은?
 ① 세린(serine) ② 라이신(lysine)
 ③ 메치오닌(methionine) ④ 발린(valine)
60. 단백질의 품질을 측정하는 생물가(BV)의 설명으로 맞는 것은?
 ① 가소화 단백질의 체단백질로의 이용가치
 ② 유사 단백질의 체내 이용가치
 ③ 에너지의 증체에 대한 이용률
 ④ 가소화 영양소의 총 열량 수준

4과목 : 사료작물학 및 초지학

61. 경운 초지를 조성할 때 작업순서로 옳은 것은?
 ① 장해물 제거 - 경운 - 쇄토 및 정지 - 시비 - 파종 - 복토 및 진압
 ② 장해물 제거 - 쇄토 및 정지 - 경운 - 시비 - 파종 -

- 복토 및 진압
- ③ 장해물 제거 - 경운 - 시비 - 쇄토 및 정지 - 파종 - 복토 및 진압
- ④ 경운 - 장해물 제거 - 쇄토 및 정지 - 시비 - 파종 - 복토 및 진압
62. 불경운 초지 대상지와 관계가 먼 것은?
- ① 경사가 심하여 기계작업이 어려운 곳
- ② 단기간에 목양력을 증가시킬 필요가 있는 곳
- ③ 토양유실이 염려되어 개간이 어려운 곳
- ④ 황폐된 목초지를 부분적으로 갱신하고자 하는 곳
63. 다음 중 체중 500kg인 젖소의 1일 생초 급여량으로 가장 적합한 것은?
- ① 100~125kg ② 50~75kg
- ③ 35~50kg ④ 75~100kg
64. 다음 목초의 수확기와 영양가의 변화에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 화본과 목초의 최적수확기는 출수기이다.
- ② 콩과식물은 최적수확기가 개화 초기부터 개화 말기까지이다.
- ③ 화본과 목초에 있어서 출수기에 단백질과 지방의 함량이 증가한다.
- ④ 콩과목초는 청예수량이 많을 때 영양수량도 증가한다.
65. 사료작물은 생존연한에 따라 일년생초, 월년생초, 다년생초 및 다년생초로 구분하는데 다년생에 속하는 화본과 및 두과 작물은?
- ① 수단그라스, 자운영
- ② 오차드그라스, 알팔파
- ③ 이탈리아라이그라스, 스위트클로버(Hubam종)
- ④ 토올페스큐, 매듭풀
66. 다음 중 오차드그라스의 주요 병해가 아닌 것은?
- ① 탄저병 ② 검은 녹병
- ③ 줄무늬마름병 ④ 맥각병
67. 다음 중 윤작의 효과가 아닌 것은?
- ① 수량증가와 품질향상
- ② 작부체계 운용의 단순화
- ③ 환원가능 유기물의 확보
- ④ 토양 전염성 병충해의 발생감소
68. 사료작물재배에 있어 가축사양의 부산물인 퇴구비를 사료생산포에 환원시켜주는 일이 토양에 미치는 영향 중 옳은 것은?
- ① 지력의 유지 및 증진 ② 지력의 악화
- ③ 지력과는 관계없음 ④ 연작피해의 증가
69. 다음 중 사일리지용으로 널리 재배되는 옥수수 종류는?
- ① 마치종 ② 폭립종
- ③ 감립종 ④ 연립종
70. 목초의 파종량을 늘려주지 않아도 좋은 경우는 다음 중 어느 때인가?

- ① 발아율이 나쁠 때 ② 파종기가 지났을 때
- ③ 건조할 때 ④ 토양의 수분함량이 충분할 때
71. 우리나라의 경우 화강암 또는 화강편마암에서 유래 하는 대부분의 토양 특성상 알팔파의 재배 및 채종을 하고자 할 때 특히 유의해야 할 점은?
- ① 토양의 건조상태 ② 토양의 유기물 함량
- ③ 석회 및 붕소의 시용 ④ 질소비료의 추비
72. 북방형 목초의 하고현상에 가장 많은 영향을 미치는 것은?
- ① 고온건조 ② 생육기의 전환
- ③ 근류의 분해 ④ 바이러스 병의 발생
73. 사일리지를 제조할 때 단점인 것은?
- ① 화재의 위험이 없다. ② 잡초를 방제한다.
- ③ 기호성이 증가한다. ④ 비타민D 함량이 감소한다.
74. 사일리지의 숙성에 필요한 최소한의 저장기간은?
- ① 3~4일 ② 2~3주
- ③ 30~40일 ④ 3~4개월
75. 사일리지의 품질을 향상시키는 첨가제로 부적당한 것은?
- ① 암모니아 ② 당밀
- ③ 요소 ④ 전분질 사료
76. 다음 중 경운용 작업기로 가장 적합한 것은?
- ① 도저 ② 쟁기
- ③ 해로우 ④ 레이크
77. 수단그라스계 잡종의 청예 이용에 관한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 초장이 너무 낮을 때 예취하여 급여하면 청산중독의 위험이 있다.
- ② 너무 낮게 수확하면 재생이 늦어지고 죽어 없어지는 개체가 발생하므로 5cm 이하로 예취하지 않는 것이 좋다.
- ③ 비가 오기 직전에 예취하는 것이 비가 온 후 충분한 수분으로 인하여 재생이 잘 된다.
- ④ 자주 예취가 가능한 조·중생종에 비하여 대가 굵고 키가 크게 자라는 만숙종은 출수되는 것을 보지 못할 때도 있다.
78. 다음에 열거한 요인 중 사일리지의 발효에 가장 영향을 적게 미치는 것은?
- ① 재료의 수분함량 ② 재료의 조단백질 함량
- ③ 재료의 수용성 탄수화물 함량 ④ 재료의 조지방 함량
79. 건초의 품질을 평가하는 방법으로 Rohwede 등 (1978)의 상대적 사료가치(relative feed value)가 많이 이용되고 있다. 알팔파 건초의 상대적 사료가치가 101~123일 경우 어느 등급에 속하는가?
- ① 1등급 ② 2등급
- ③ 3등급 ④ 4등급
80. 불경운 초지조성시 선점식생을 제거하는 방법 중 틀린 것은?
- ① 강방목(强放牧) ② 제초제(除草劑)
- ③ 화입(火入) ④ 시비(施肥)

5과목 : 축산경영학 및 축산물가공학

81. 번식돈 경영에서 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

- ① 육성률을 높인다.
- ② 분만두수가 많은 종돈을 선택한다.
- ③ 종돈의 사육비용을 높인다.
- ④ 연간 분만횟수를 늘린다.

82. 축산경영조직에 있어서 단일화의 장점으로 맞는 것은?

- ① 농기구나 시설의 도입이 용이
- ② 자금회전의 원활화
- ③ 토지의 합리적인 이용과 토지비용의 감소
- ④ 노동력배분의 평준화 및 수입의 평균화

83. 축산경영에서 공동조직의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 민주화의 원칙 ② 공평의 원칙
- ③ 유리성의 원칙 ④ 경쟁의 원칙

84. 축산경영의 일반적 특징에 해당하는 것은?

- ① 농업의 안정화 ② 물량감소의 성격
- ③ 토지의 이용증진 ④ 노동력의 이용증진

85. 축산경영 규모를 측정하는 척도가 아닌 것은?

- ① 토지면적 ② 조생산액
- ③ 자본회전율 ④ 가축두수

86. 다음은 생산물의 결합형태 중 무엇에 관한 설명인가?

- 한 가지 생산물을 생산할 때 다른 생산물의 생산이 일정한 비율로 생산
- 양털과 양고기, 쇠고기와 우유 등이 해당됨

- ① 포함생산 ② 결합생산
- ③ 경합생산 ④ 보완생산

87. 한우 번식경영에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사육규모가 영세하다.
- ② 적당한 운동이 필요하다.
- ③ 번식간격의 단축이 과제이다.
- ④ 농후사료를 많이 급여하여야 한다.

88. 계란 1kg의 가격이 1500원이고, 사료 1kg의 가격은 250원 일 경우 난사비는?

- ① 2.0 ② 5.0
- ③ 6.0 ④ 4.0

89. 생산함수 중 수확(收穫)체증인 형태의 설명으로 맞는 것은?

- ① 투입물의 각 추가단위에 대하여 생산물이 동일한 양으로 증가하는 생산함수
- ② 생산요소를 추가로 투입할수록 그에 따라 얻어지는 추가 생산물의 비율이 점점 높아가는 생산함수
- ③ 생산요소를 추가로 투입할수록 그에 따라 얻어지는 추가 생산물의 비율이 점점 작아지지만 총생산량은 증가하는 생산함수
- ④ 생산요소를 추가로 투입할수록 그에 따라 얻어지는 추가

생산물의 비율이 점점 증가하지만 총생산량은 감소하는 생산함수

90. 취득원가 100만원, 폐기가격 10만원, 내용연수가 5년인 고정자본재의 감가상각비는 얼마인가? (단, 정액법으로 계산)

- ① 20만원 ② 19만원
- ③ 18만원 ④ 17만원

91. 자산을 구입할 경우 구입가격과 구입시 소요되는 제반비용을 합산하여 평가하는 방법은?

- ① 시가 평가법 ② 수익가 평가법
- ③ 추정가 평가법 ④ 취득원가법

92. 토지가 다른 고정자본재와 달리 감가상각을 필요로 하지 않는 이유로 올바른 것은?

- ① 조사료를 생산하기 때문에
- ② 토지 자체가 소모되지 않기 때문에
- ③ 토지의 지력이 소모되지 않기 때문에
- ④ 토지가 지역에 따라 자연적 여건이 다르기 때문에

93. 축산경영 효율지표 중 경제적 효율지표가 아닌 것은?

- ① 축산자본 회전율 ② 축산노동단위당 자본투하액
- ③ 축산물 1kg당 사료비 ④ 비육돈 일당 증체량

94. 시험성적이나 전문가의 경험을 토대로 가장 이상적인 진단지표를 작성한 뒤 진단농가와 비교하는 경영진단 방법은?

- ① 자기진단법 ② 직접비교법
- ③ 표준비교법 ④ 지수법

95. 비육돈의 비육기간이 90일이고, 이 기간 동안 증체량이 54kg이었다면 1일당 증체량은?

- ① 600g ② 550g
- ③ 500g ④ 450g

96. Norfolk 윤재식 농법에서 지력증진 작목으로 재배한 것은?

- ① 보리 ② 밀
- ③ 벼 ④ 클로버

97. 비육우의 두당 조수입이 270만원, 소득이 81만원일 때 소득률은?

- ① 60% ② 50%
- ③ 40% ④ 30%

98. 축산경영자의 역할 중 경제적 측면의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 사료작물과 가축의 종류 선택 및 결정
- ② 생산과정 관리
- ③ 경영성과분석 및 계획 수립
- ④ 생산부문의 경영집약도 결정

99. 양돈비육농가가 자돈을 30kg에 구입하여 106일 동안 사육한 후 체중이 110kg일 때 출하하였다. 이 기간 동안 비육돈 두당 사료섭취량은 228kg이었다면 이 농가의 총사료 요구율은?

- ① 2.75 ② 2.80
- ③ 2.85 ④ 2.90

100. 양계의 수익성을 극대화하기 위한 방안이 아닌 것은?

- ① 폐사율을 감소시킨다.
- ② 품질 및 상품가치의 균일성을 유지시킨다.
- ③ 생산능력을 향상시킨다.
- ④ 사료요구율을 높인다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	②	③	②	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	③	②	④	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	②	①	④	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	④	①	②	③	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	①	④	③	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	③	③	③	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	③	②	④	②	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	③	①	②	③	④	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	④	②	③	②	④	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	③	①	④	④	②	③	④