1과목: 화약 및 발파


- 1. 탄광용 폭약의 감열소염제로 주로 쓰이는 것은?
 - ① 알루미늄
- ② 염화나트륨
- ③ 염화바륨
- ④ 질산암모늄
- 2. 다음 중 뇌관의 첨장략으로 사용되지 않는 것은?
 - ① 테트릴(Tetryl)
- ② 헥소겐(Hexogen)
- ③ 카알릿(Carlit)
- ④ 펜트리트(Pentrite)
- 3. Hg(ONC) 는 다음 중 무엇인가?
 - ① 초유폭익
- ② 피크린산
- ③ 질화납
- 4 뇌홍
- 4. 니트로글리세린(NG)에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - ① 인체에 흡수되어도 해롭지 않다.
 - ② 글리세린을 질산과 황산으로 처리한 무색 또는 담황색 액체이다.
 - ③ 동결온도는 -10℃이다.
 - ④ 물에 녹으나, 알콜, 아세톤에는 녹지 않는다.
- 5. 다음 중 폭약의 선정방법으로 틀린 것은?
 - ① 강도가 큰 암석에는 동적효과가 큰 폭약을 사용한다.
 - ② 장공발파에는 비중이 큰 폭약을 사용한다.
 - ③ 굳은 암석에는 동적효과가 큰 폭약을 사용한다.
 - ④ 고온의 막장에서는 내열성 폭약을 사용한다.
- 누두공 시험에서 누두공의 모양과 크기에 영향을 미치는 요소로 틀린 것은?
 - 1 뇌관 각선의 길이
 - ② 암반의 종류
 - ③ 폭약의 위력 및 메지의 정도
 - 4 약실의 위치와 자유면의 거리
- 7. 계단식 노천 발파시 암석 비산의 중요한 원인으로 가장 관 련이 적은 것은?
 - ① 단층, 균열, 연약면 등에 의한 암석의 강도 저하
 - ② 천공시 잘못으로 인한 국부적인 장약공의 집중 현상
 - ③ 초시가 빠른 비전기식 뇌관 사용
 - ④ 정화순서의 착오에 의한 지나친 지발시간
- 8. ANFO 폭약의 폭발 반응식은 다음과 같다. ()안에 알맞은 것은?

3NH4NOs+CH2→3N2+7H2O+(

)+82(kcal/mol)

- ① O₂
- 2 NO₃
- 3 CH₄
- **1** CO₂
- 9. 질산암모늄을 함유하지 않은 스트레이트 다이나마이트를 장기간 저장하면 NG와 NC의 콜로이드화가 진행되어 내부의기포가 없어져서 다이나마이트는 둔감하게 되고 결국에는 폭발이 어렵게 된다. 이와 같은 현상을 무엇이라 하는가?
 - ① 고화
- 2 노화
- ③ 질산화
- ④ 니트로화

- 10. 다음 중 화약의 폭발속도를 측정하는 방법이 아닌 것은?
 - ① 도트리시법
- ② 메테강법
- ③ 오실로그래프법
- 4 크루프식법
- 11. 전색물의 구비조건으로 틀린 것은?
 - ❶ 발파공벽과의 마찰이 작을 것
 - ② 단단하게 다져질 수 있을 것
 - ③ 재료의 구입과 운반이 쉬울 것
 - ④ 연소되지 않을 것
- 12. 다음 중 라인드릴링(line-drilling)법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 목적하는 파단선에 따라서 근접한 다수의 무장약공을 천공하여 인공적인 파단면을 만드는 방법이다.
 - ② 벽면 암반의 파손이 적으나 많은 천공이 필요하므로 천 공비가 많이 든다.
 - ③ 천공은 수직으로 같은 간격으로 하여야 하므로 천공 기 술이 필요하다.
 - 총리 절리 등을 지닌 이방성이 심한 양반구조에 가장 효과적으로 적용되는 방법이다.
- 13. 전기뇌관 12개를 그림과 같이 결선하고 재발시키려 한다. 이때 필요한 소요전압은 얼마인가? (단, 뇌관 1개 저항은 1.2[Ω], 발파모션의 총길이는 100[m], 모선의 저항은 0.02[Ω/m]이며, 소요전류는 2[A]이고 내부저항은 고려치 않는다.)



- ① 7.2[V]
- 2 17.4[V]
- **3** 21.6[V]
- (4) 28.8[V]
- 14. 건조단위중량이 1.70t/m³이고 비중이 2.80 인 흙의 공극비 (e)는 얼마인가?
 - ① 0.32
- ② 0.47
- ③ 0.55
- **4** 0.65
- 15. 초유폭약(AN-FO)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 질산암모늄과 경유를 혼합하여 제조한다.
 - ② 발파작업시에는 반드시 전폭약포가 필요하다.
 - ③ 석회석의 채석 등 노천채굴에 적합하다.
 - 4 흡습성이 없어 장기저장이 가능하다.
- 16. 한개의 약포가 그 옆에 있는 다른 약포의 폭굉에 의하여 반응 폭발하는 현상을 무엇이라 하는가?
 - 1 순폭
- ② 기폭
- ③ 완폭
- ④ 불폭
- 17. 어떤 양반에 대한 시험발파에서 장약량 700g으로 누두지 수=1.2인 발파가 되었다면, 동일 암반에서 같은 최소저항 선으로 n=1인 표준발파가 되도록 하기 위한 장약량은?
 - ① 395.19g
- ② 425.11g

- **3** 457.82g
- (4) 506.12g
- 18. 자유면 벤치 발파에서 다음과 같은 조건일 때 장약량은 얼마인가? (단, 최소저항선: 2m, 천공간격: 2m, 벤치높이: 3m, 발파계수: 0.15)
 - **1**.8kg
- 2 4.05kg
- ③ 24kg
- (4) 36kg
- 19. 다음 중 소할발파법에 속하지 않는 것은?
 - ❶ 미진동법
- ② 복토법
- ③ 사혈법
- ④ 천공법
- 20. 반 분류방법 중 RMR 값을 산정하기 위한 주요 인자가 아 닌 것은?
 - 1 암석의 일축인장강도
- ② 암질 계수(RQD)
- ③ 지하수의 상태
- ④ 불연속면 상태

2과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

- 21. 번컷(Burn-cut)에 대한 설명이다. 틀린 것은?
 - ① 심발공 내에 무장약공을 천공한다.
 - ② 장약공은 메지를 하지 않고, 공 전체에 폭약을 장전한 다.
 - ③ 심발공 내에 천공한 무장약공은 자유면 역할을 한다.
 - ④ 번컷(Burn-cut)은 평행공 심발공법에 해당한다.
- 22. 어느 보안물건의 허용진동기준이 0.3cm/sec이고, 시험발 파과 환산거리를 65m/kg^{1/2}로 제한하여 발파하도록 하였 다. 보안물건과 이격거리 100m 지점에서 사용할 수 있는 지 당 장약량은 얼마인가? (단, 자승근 환산거리를 적용하 여 계산)
 - ① 1.15kg
- **2** 2.37kg
- ③ 3.00kg
- 4 6.50kg
- 23. kg/cm²의 수압에서 젤라틴 다이너마이트를 완전히 폭발시 키기 위해 첨가해 주는 것은?
 - ❶ 황산바륨
- ② 알루미늄
- ③ 옥분
- ④ 염화나트륨
- 24. 다음 중 암반사면의 파괴형태에 소하지 않는 것은?
 - ① 평면파괴
- 2 취성파괸
- ③ 쐐기파괴
- ④ 전도파괴
- 25. 다음 중 집중발파(조합발파)의 특징으로 틀린 것은?
 - ① 파괴암석의 분쇄가 적어진다.
 - ② 단일발파보다 동일 장악량에 비해 많은 채석량을 얻는 다.
 - ③ 파괴암석의 비산이 적다.
 - 4 최소저항선을 감소시킬 수 있다.
- 26. 화약류운반신고를 하고자 하는 사람은 화약류운반신고서를 특별한 사정이 없는 한 운반개시 몇 시간 전까지 발송지를 관할하는 경찰서장에게 제출해야 하는가?
 - ① 1시간
- 2 4시간
- ③ 8시간
- ④ 24시간
- 27. 화약류 취급소의 정체량으로 맞는 것은? (단, 1일 사용예

정량 이하임)

- ① 회약 400kg 이하
- ② 폭약(초유폭약 제외) 400kg 이하
- ③ 전기뇌관 3500개 이하
- ♪ 도폭선 6km 이하
- 28. 다음 중 정기안전검사를 받아야 하는 대상시설에 해당하지 않는 것은?
 - ① 꽃불류제조소의 제조시설 중 위험공실
 - ② 1급 화약류저장소
 - ③ 2급 화약류저장소
 - ₫ 3급 화약류저장소
- 29. 총포·도검·화약류 등 단속법 위반에 의한 과태료 처분에 불복이 있는 사람은 그 처분이 있음을 안 날로부터 몇 일이내에 관할관청에 이의를 제기할 수 있는가?
 - ① 15일 이내
- ② 20일 이내
- 30일 이내
- ④ 60일 이내
- 30. 꽃불류저장소 주위의 방폭벽은 두께 몇 cm 이상의 철근콘 크리트조로 하여야 하는가?
 - ① 10cm
- **2** 15cm
- 3 20cm
- (4) 25cm
- 31. 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 사용할 수 있는 사람 으로서 건축, 토목공사용으로 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 수량으로 맞는 것은?
 - ① 산업용 실탄 200개 이하
 - ② 미진동 파쇄기 1500개 이하
 - ③ 광쇄기 200개 이하
 - 4 건설용 타정총용 공포탄 5000개 이하
- 32. 양수허가의 유효기간은 얼마를 초과할 수 없는가?
 - ① 3개월
- ② 6개월
- **8** 1년
- ④ 2년
- 33. 간이저장소의 위치・구조 및 설비의 기준으로 틀린 것은?
 - ① 벽과 천정(2층 이상의 건물인 경우에는 그 층의 바닥을 포함한다.)의 두께는 10cm 이상의 철근 콘크리트로 할 것
 - ② 지붕은 10cm 이상의 철근 콘크리트로 할 것
 - ③ 출입문은 두께 2mm 이상의 철판으로 2중문을 설치할 것
 - ④ 자동소화 설비를 갖출 것
- 34. "공실"에 대한 정의로 맞는 것은?
 - ① 발화 또는 폭발할 위험이 있는 화약고 등의 시설을 하기 위한 건축물
 - 화약류의 제조작업을 하기 위하여 제조소안에 설치된 건축물
 - ③ 화약류의 제조과정에서 화약류를 일시적으로 저장하는 장소
 - ④ 화약류의 취급상의 위해로부터 보호가 요구되는 건축물
- 35. 화약류를 발파 또는 연소시키려는 사람은 누구에게 사용허 가를 받아야 하는가? (단, 예외사항은 제외)


- ① 사용지 관할 지방경찰청장
- 2 사용지 관할 경찰서장
- ③ 사용지 관할 구청장
- ④ 사용지 관할 시장
- 36. 지각을 구성하고 있는 8대 원소에 포함되지 않는 것은?
 - ① 수소(H)
- ② 나트륨(Na)
- ③ 알루미늄(AI)
- ④ 철(Fe)
- 37. 암석이 재결정작용을 받아 운모와 같은 판상의 광물이 평 행하게 배열되면 변성암은 평행구조를 나타내게 되는데 이 런 구조를 무엇이라 하는가?
 - ① 연흔
- 2 엽리
- ③ 충리
- ④ 박리
- 38. 대규모의 습곡에 작은습곡을 동반하는 다음 그림과 같은 지질구조의 명칭은?



- ① 침강 습곡
- 2 복배사, 복항사
- ③ 횡와 습곡
- ④ 드래그 습곡
- 39. 현무암이나 반려암보다 화강암이나 유문암에 많은 화학성 분은 무엇인가?
 - 1 CaO, MgO, Fe₂O₃ 2 K₂O, Na₂O, SiO₂
- - 3 CaO, SiO₂, MgO 4 FeO, K₂O, Na₂O
- 40. 지각 변동 때 발생하는 응력이나 앙석이 고화될 때 수축에 의해 생기는 것으로 암석에서 관찰되는 쪼개진 틈을 무엇 이라 하는가?
 - ① 습곡
- ② 단층
- ③ 정합
- 4 절리

3과목 : 암석 및 지질

41. 다음 그림은 암석의 윤회과정을 나타낸 것이다. A, B, C, D에 해당되는 작용은 무엇인가?



- ① A-결정작용, B-고화작용, C-용융작용, D-변성작용
- 2 A-결정작용, B-고화작용, C-변성작용, D-용융작용
- ③ A-용융작용, B-변성작용, C-결정작용, D-고화작용
- ④ A-용융작용, B-고화작용, C-변성작용, D-결정작용
- 42. 화성암을 산성암, 중성암 및 염기성암 등으로 분류하는데 기준이 되는 화학성분은?
 - ① K₂O, Na₂O
- 2 FeO, Fe₂O₃
- 3 Al₂O₃
- 4 SiO₂

- 43. 화산암에 있어서 마그마가 유동하면서 굳어진 구조를 무엇 이라 하는가?
 - 1 유상구조
- ② 다공상구조
- ③ 행인상구조
- ④ 구상구조
- 44. 다음 중 화학적 퇴적암으로만 나열된 것은?
 - ① 역암, 각력암
- ② 셰일, 응회암
- ③ 쳐어트, 규조토
- 4 석고, 암염
- 45. 지각온 화성암, 퇴적암, 변성암으로 구성되어 있는데, 변성 암을 변성되기 전의 원암으로 계산할 때 지구표면 근처에 는 표토를 제외하고 퇴적암과 화성암의 양적비율이 어떻게 되는가?

❶ 퇴적암 75% : 화성암 25% ② 화성암 75% : 퇴적암 25% ③ 화성암 95% : 퇴적암 5%

- ④ 퇴적암 95% : 화성암 5%
- 46. 다음 중 한반도에서 아직 발견되지 않고 있는 지질 시대 **⊢**?
 - ① 제3기
- 2 데본기
- ③ 쥐라기
- ④ 메룸기
- 47. 다음 중 야외에서 단층을 확인하는 증거로 사용되지 않는 것은?
 - ① 단층점토
- ② 단층면의 주향·경사
- ③ 단층각력
- ④ 단층면의 긁힌 자국
- 48. 현정질 및 비현정질 조직에 있어서 상대적으로 유난히 큰 광물알갱이들이 반점 모양으로 들어 있는 경우 이러한 화 성암의 조직은?
 - ① 반상조직
- ② 구상조직
- ③ 미정질조직
- 4 유리질조직
- 49. 다음에서 설명하는 것은?

미것은 하나의 규산염용제로서 50-200km의 깊이 에 있는 상부 맨틀이나, 또는 5-10km 깊이의 비 교적 얕은 지각에서 생성된다. 맨틀에서 생성되는 것은 대체로 실리카가 적으며 지각에서 생성되는 것은 실리카의 함유가 높은 편이다.

- ① 시마(sima)
- ② 엘랑지
- 8 마그마
- ④ 오피올라이트
- 50. 지하의 마그마가 지표에 분출하거나 지각에 관입하여 굳어 진 암석은 무엇인가?
 - 화성암
- ② 퇴적암
- ③ 변성암
- ④ 편마암
- 51. 다음 중 규산암 광물이 아닌 것은?
 - ① 홍주석
- ② 석영
- ❸ 빙해석
- ④ 정장석
- 52. 다음 중 엽리를 찾아보기 어려운 변성암은?
 - ① 슬레이트
- ② 편암

- ③ 편마암
- 4 규암
- 53. 다음 중 쇄설성 퇴적암을 분류하는데 이용되는 대표적인 기준은?
 - ❶ 구성입자의 크기
- ② 화학성분
- ③ 퇴적구조
- ④ 화석의 종류
- 54. 주로 셰일로부터 변성된 접촉변성암으로서 흑색 셰립의 치 밀·견고한 암석을 무엇이라 하는가?
 - ① 대리암
- 2 혼펠스
- ③ 천매암
- ④ 편마암
- 55. 현무암질 마그마의 분화작용에 따른 암석의 생성 순서로 옳은 것은?
 - ① 화강암→섬록암→반려암
 - ② 섬록암→화강암→반려암
 - ③ 화강암→반려암→섬록암
 - 4 반려암→섬록암→화강암
- 56. 다음 중 규장암에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 간혹 석영의 반정을 가진다.
 - ② 석물의 화석을 포함하는 경우가 많다.
 - ③ 흰색이며 비현정질의 치밀한 암석이다.
 - ④ 절리면에는 모수석(dendrite)이 생겨 있는 경우가 많다.
- 57. 다음 중 부정합면 아래에 결정질인 암석(심성암·변성암) 이 있는 부정합은?
 - ❶ 난정합
- ② 준정합
- ③ 사교부정합
- ④ 평행부정합
- 58. 다음 중 주향과 경사에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - ① 주향은 지층면과 수평면이 이루는 각이다.
 - ② 경사는 경사된 지층면과 수평면과의 교차선의 방향이 다.
 - ③ 주향은 항상 자북방향을 기준으로 측정한다.
 - 경사각을 기재할 때 기울기가 50°이고 기울어진 쪽의 방향이 남동쪽이면 50° SE가 된다.
- 59. 다음 보기에서 광역변성암에 해당하는 것을 옳게 표시한 것은?
 - ① 편마암 ② 규암 ③ 대리암 ④ 편암 ⑤ 첨내암
 - 1 1,2,3
- 2 2,3,4
- **3** (1),(4),(5)
- **4 2**,**4**,**5**
- 60. 다음과 같은 특징을 가지고 있는 퇴적암은?
 - 겉모양은 총리가 잘 보이며 판상이다.
 - 주성분은 석영 알갱이와 점토 광물이다.
 - 보통 노랑, 붉은색, 갈색, 회색, 검정색을 띤다.
 - 입자의 크기는 보통 1/16mm 이하로 육안 구별 이 어렵다.
 - ① 응회암
- ② 석회암
- ③ 역암
- 4 세일

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	2	2	1	3	4	2	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	3	4	4	1	3	1	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	2	1	2	4	2	4	4	3	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	3	3	2	2	1	2	2	2	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	1	4	1	2	2	1	3	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	1	2	4	2	1	4	3	4