

1과목 : 심리학개론

1. 사회학습이론에 입각한 성격에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 사회학습이론에서는 성격이 인지과정이나 동기에 의한 영향을 인정하지 않는다.
 ② 사회학습이론에서는 관찰학습과 모델링을 통해서 보상받는 행동을 대리적으로 학습한다고 한다.
 ③ 사회학습이론에서는 행동에 대한 환경적 변인의 독립적인 영향을 강조한다.
 ④ 반두라는 개인이 자신의 노력으로 원하는 결과를 얻을 수 있다는 신념이나 기대를 자기존중감(self-esteem)이라고 하였다.
2. 강화에 요구되는 반응의 수를 어떤 평균을 중심으로 변화시키는 강화계획은?
 ① 고정간격계획 ② 고정비율계획
 ③ 변화비율계획 ④ 변화간격계획
3. 유아의 초기결핍이 지속적인 영향을 주는 영역과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 언어능력 ② 지적능력
 ③ 운동기능 ④ 정서발달
4. 굶주린 개에게 종소리를 들려주어 조건형성을 하는 파블로프의 실험에서 무조건자극은 무엇인가?
 ① 종소리 ② 먹이
 ③ 침을 흘림 ④ 불빛
5. 다음 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 것은?

철수는 영화와의 약속장소에 지하철로 가는 도중 안전사고가 발생하며 정한 시간에 늦었음에도 불구하고, 영화는 철수가 약속시간을 잘 지키지 않는 성격특성을 가지고 있다고 생각한다.

 ① 절감원리 ② 공변이론
 ③ 대응추리이론 ④ 기본적 귀인오류
6. 프로이트의 성격구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 이드는 쾌락원칙을 따른다.
 ② 초자아는 항문기의 배변훈련 과정을 겪으면서 발달한다.
 ③ 성격의 구조 가운데 가장 마지막으로 발달하는 체계가 초자아이다.
 ④ 자아는 성격의 집행자로서, 인지능력에 포함된다.
7. 태도의 3가지 주요 구성요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 인지적 요소 ② 감정적 요소
 ③ 귀인적 요소 ④ 행동적 요소
8. 소거가 영구적인 망각이 아니라는 증거가 될 수 있는 것은?
 ① 자극 일반화(stimulus generalization)
 ② 변별(discrimination)
 ③ 조형(shaping)
 ④ 자발적 회복(spontaneous recovery)
9. 심리검사가 측정하고자 하는 내용이나 속성을 실제 얼마나

- 잘 측정하는지를 나타내는 개념은 무엇인가?
 ① 표준화 ② 난이도
 ③ 타당도 ④ 신뢰도
10. 달이 구름 속을 떠다니는 것처럼 보이는 현상은?
 ① 깊이지각 ② 형태지각
 ③ 가현운동 ④ 유인운동
 11. 미네소타 다면적 인성검사(MMPI)와 캘리포니아 심리검사(CPI)의 비교설명으로 옳은 것은?
 ① MMPI는 구조화된 검사인 반면, CPI는 비구조화된 검사이다.
 ② MMPI는 투사검사인 반면, CPI는 질문지 검사이다.
 ③ MMPI는 임상장면의 기준집단을 사용하여 개발된 반면, CPI는 정상인을 기준집단으로 개발된 검사이다.
 ④ MMPI는 과거 행동에 중점을 둔 반면, CPI는 미래 행동에 중점을 두고 있다.
 12. 과자의 양이 적다는 어린 꼬마에게 모양을 다르게 했더니 많다고 좋아한다. 그 아이의 논리적 사고를 피아제 이론으로 본다면 다음 문제 중 어디에 속하는가?
 ① 자기중심성의 문제
 ② 대상연속성의 문제
 ③ 보존 개념의 문제
 ④ 가설-연역적 추론의 문제
 13. 아들러가 인간의 성격을 설명하면서 강조하지 않은 부분은?
 ① 열등감의 보상 ② 우월성 추구
 ③ 힘에 대한 의지 ④ 신경증 욕구
 14. 다음 중 동조의 예로 가장 적당한 것은?
 ① 내가 좋아하는 스타가 광고하는 음료수를 산다.
 ② 어느 대통령 후보의 연설에 감동해서 그를 지지한다.
 ③ 상관의 부당한 지시를 마지못해 따른다.
 ④ 미니스커트가 유행이어서 나도 미니스커트를 입는다.
 15. 성격 특성들 간의 관련성에 관한 개인적 신념으로서 타인의 성격을 판단하는 틀로 이용하는 것은?
 ① 기본적 귀인 오류
 ② 고정관념
 ③ 내현 성격이론(implicit personality theory)
 ④ 자기 기여 편향(self-serving bias)
 16. 다음 중 내적 타당도를 위협하는 요소가 아닌 것은?
 ① 제3의 변수 개입 ② 시험효과
 ③ 측정 도구상의 문제 ④ 낮은 통계 검증력
 17. Maslow의 욕구의 위계이론에서 제일 밑바탕에 있는 가장 기본적인 욕구는 무엇인가?
 ① 생리적 욕구 ② 안정 욕구
 ③ 소속감 욕구 ④ 자아실현욕구
 18. '대학생들은 축구와 야구 중에 어느 것을 더 좋아하는가'라는 문제를 검증하는 경우처럼, 빈도나 비율의 차이검증에 가장 적합한 분석 방법은?
 ① t 검증 ② F 검증

③ Z 검증

④ X2 검증

19. Freud의 심리성적 발달단계와 Erikson의 심리사회발달단계가 해당연령별로 바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① 출생~약 18개월 : 구강기, 신뢰감 대 불신감
- ② 약 18개월~약 3세 : 항문기, 자율성 대 수치감
- ③ 약 3세~약 6세 : 생식기, 친근성 대 고립감
- ④ 약 6세~약 11세 : 잠복기, 근면성 대 열등감

20. 피아제의 인지발달이론에서 대상영속성 개념을 처음으로 획득하는 시기는?

- ① 감각운동기 ② 전조작기
- ③ 구체적 조작기 ④ 형식적 조작기

2과목 : 이상심리학

21. 다음 중 경계선 성격장애의 임상적 특징이 아닌 것은?

- ① 실제적 또는 가상적 유기를 피하기 위하여 필사적인 노력
- ② 타인에 대한 극단적인 이상화와 평가절하를 번갈아하는 불안정하고 강력한 대인관계 방식
- ③ 반복적인 자살행동과 만성적인 공허감
- ④ 자신의 중요성에 대한 과장된 지각과 특권의식 요구

22. 환각(hallucination)은 다음 중 어떤 부분의 왜곡인가?

- ① 지각 ② 행동
- ③ 사고 ④ 관계

23. 다음 중 알츠하이머형 치매에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기억 착오와 혼돈이 뚜렷한 특징이다.
- ② 알츠하이머형 치매와 밀접한 관련이 있다고 밝혀진 신경 전달물질은 도파민이다.
- ③ 가계에 따라 전달되는 경향이 있으며, 남성보다는 여성에게서 더 빈번히 발생한다.
- ④ 뇌혈관 질환이나 비타민 B12 부족으로 인해 점진적인 기억과 인지장애를 보이는 경우에는 진단을 배제한다.

24. 다음 중 정신분열병의 양성증상에 포함되지 않는 것은?

- ① 망상 ② 환각
- ③ 와해된 언어 ④ 감정적 둔마

25. 성도착증의 유형에 관한 설명이 옳게 연결된 것은?

- ① 노출증 - 다른 사람이 옷을 벗고 있는 모습을 몰래 훔쳐 보으면서 성적 흥분을 느끼는 경우
- ② 관음증 - 동의하지 않는 사람에게 자신의 성기나 신체 일부를 접촉하거나 문지르는 행위를 반복적으로 나타내는 경우
- ③ 소아 애호증 - 사춘기 이전의 소아를 대상으로 하여 성적 공상이나 성행위를 반복적으로 나타내는 경우
- ④ 성적 가학증 - 굴욕을 당하거나 매질을 당하거나 묶이는 등 고통을 당하는 행위를 중심으로 성적흥분을 느끼거나 성적 행위를 반복하는 경우

26. 다음 중 DSM-4에서 분류하고 있는 이상하고 특이한 집단인 성격장애인 A군에 포함되지 않는 것은?

- ① 편집성 성격장애 ② 분열성 성격장애

③ 분열형 성격장애

④ 회피성 성격장애

27. '외모가 중요해', '나는 언제나 다른 사람의 주의를 끌어야 해', '감정은 즉각적으로 직접 표현해야해' 등과 같은 인지도식을 가진 성격장애는?

- ① 편집성 성격장애 ② 히스테리성 성격장애
- ③ 자기애성 성격장애 ④ 강박성 성격장애

28. 불안장애의 대표적인 원인론 중 2요인 학습이론과 거리가 먼 것은?

- ① 모델링의 효과를 잘 설명한다.
- ② 공포 감소에 대한 노출치료의 이론적 근거를 제공한다.
- ③ 2요인이란 고전적 조건형성과 조작적 조건형성을 각각 말한다.
- ④ Mowrer가 주장하였다.

29. 다음 중 치매와 우울증의 증상 구분에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 치매는 기억손실을 감추려는 시도를 하는데 반해 우울증에서는 기억손실을 불평한다.
- ② 치매는 자기의 무능이나 손상을 과장하는데 반해 우울증에서는 숨기려 한다.
- ③ 우울증보다 치매에서 알코올 등의 약물남용이 많다.
- ④ 우울증에서는 증상의 진행이 고른데 반해 치매에서는 몇 주 안에도 진행이 고르지 못하다.

30. 이미 존재하지 않는 신체 부분에 대한 환각으로, 사지를 절단한 후에 흔히 나타나는 것은?

- ① 반사환각 ② 팬텀(phantom)현상
- ③ 운동환각 ④ 신체환각

31. 분열성 성격장애(schizoid PD)의 주요증상에 해당하지 않는 것은?

- ① 친밀한 관계를 원하지도 즐기지도 않는다.
- ② 거의 항상 혼자서 하는 활동을 선택한다.
- ③ 사고와 언어가 괴이하거나 엉뚱하다.
- ④ 타인의 칭찬이나 비평에 무관심해 보인다.

32. DSM-4에서 알코올 의존과 알코올 남용을 구분하는 기준이 아닌 것은?

- ① 내성 ② 금단증상
- ③ 강박적인 음주패턴 ④ 다중 약물중독

33. 다음 중 주의력 결핍 및 과잉활동장애의 특성에 해당되지 않는 것은?

- ① 수줍음 ② 산만성
- ③ 학업문제 ④ 또래들과 어울리는데 어려움

34. 반사회적 성격장애의 일반적 행동특성과 거리가 먼 것은?

- ① 높은 충동성
- ② 목표 지향적 활동의 결여
- ③ 공포 유발 자극에 대한 과도한 불안반응
- ④ 정서적 자극과 흥분, 스릴의 추구

35. 알코올 중독과 비타민 B1(티아민) 결핍이 결합되어 만성 알코올중독자에게 발생하는 장애로, 최근 및 과거 기억을 상실하고 새롭게 기억을 형성하지 못하는 인지손상장애는?

- ① 간질 ② 혈관성 치매
- ③ 헌팅턴 질환 ④ 코르사코프 증후군

36. 알코올 의존의 원인으로 틀린 것은?

- ① 생물학적 입장에서 유전적 요인이나 알코올 신진대사 기능에서의 차이를 원인으로 본다.
- ② 사회문화적 관점에서는 음주에 대한 사회의 관대한 태도가 알코올 의존의 원인이라고 본다.
- ③ 행동주의 입장에서 알코올이 불안을 줄여주는 단기적 강화효과가 알코올 의존의 원인이 된다고 본다.
- ④ 정신분석적 입장에서 알코올 의존을 남성다움을 나타내는 한 방법으로 간주한다.

37. 다음 중 긴장형 정신분열증 환자의 특징적 증상이 나타나는 영역은?

- ① 사고형태 ② 주의 및 지각
- ③ 운동기능 ④ 정동

38. 자폐증에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자폐증은 발달장애의 한 유형이다.
- ② 자폐증 아동은 애착장애는 보이지 않는다.
- ③ 자폐증은 아동 정신분열병의 일종이며 환각과 망상을 보인다.
- ④ 자폐증 아동은 주변 사람들과 관계 형성에 어려움이 있으나, 언어구사능력에는 손상이 없다.

39. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

IQ점수가 70보다 낮은 사람들 중 약 85%가 해당한다. 이들은 학교에 입학할 때까지는 정상아동과 반드시 구분되지는 않는다. 10대 후반이 되면 통상적으로 6학년 수준의 학습능력을 학습할 수 있다. 성인이 되면 사회적, 경제적인 문제가 있어서 도움이 필요하더라도, 숙련을 요하지 않는 작업장이나 보호받는 작업장에서는 자활할 수 있으며, 결혼을 해서 아이를 낳아 기를 수 있다.

- ① 가벼운 정신지체
- ② 중간 정도의 정신지체
- ③ 심한 정도의 정신지체
- ④ 아주 심한 정도의 정신지체

40. A양은 음대 입학시험을 앞두고 소리가 나오지 않는 증상이 일어났다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단은?

- ① 강박장애 ② 건강염려증
- ③ 전환장애 ④ 특정공포증

3과목 : 심리검사

41. 심리평가를 위한 면담기법 중 비구조화된 면담 방식의 장점으로 볼 수 있는 것은?

- ① 면담자 간의 진단 신뢰도를 높일 수 있다.
- ② 연구 장면에서 활용하기가 용이하다.
- ③ 중요한 정보를 깊이 있게 탐색할 수 있다.
- ④ 점수화하기에 용이하다.

42. 웨슬러 지능검사에 대한 해석 시 주의해야 할 점이 아닌 것은?

- ① 동작성 검사와 언어성 검사 점수의 차이는 중요한 의미가 있다.
- ② 개인의 내적 분석을 통해 강점과 약점이 무엇인지를 알아낸다.
- ③ 규준분석을 통해 다른 사람에 비해 얼마나 높은지를 비교한다.
- ④ 단기기억력 등 특정 능력은 한 가지 소검사에서만 측정된다.

43. 다음 중 Luria-Nebraska 신경심리검사에 포함되지 않는 척도는?

- ① 운동 ② 리듬
- ③ 집중 ④ 촉각

44. 피검자가 매우 피곤하고 불안한 상태에서 웨슬러 지능검사를 실시할 경우 가장 부정적인 영향을 받을 가능성이 높은 검사는?

- ① 토막짜기 - 어휘문제
- ② 숫자문제 - 공통성문제
- ③ 기본지식 - 바뀐쓰기
- ④ 산수문제 - 바뀐쓰기

45. 검사-재검사 신뢰도 방법으로 심리검사의 신뢰도를 구할 때의 단점에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 두 검사 사이의 시간 간격이 너무 길면 측정대상의 속성이나 특성이 변할 가능성이 있다.
- ② 반응 민감성에 의해 검사를 치르는 경험이 개인의 진점수를 변화시킬 가능성이 있다.
- ③ 두 검사 사이의 시간 간격이 너무 짧으면 첫 번째 검사 때 응답했던 것을 기억해서 그대로 쓰는 이월효과가 있다.
- ④ 경비가 절감되나 시간이 너무 오래 걸린다.

46. 특정 학습과정이나 직업에 대한 앞으로의 수행능력과 적응도를 예측하는 검사는?

- ① 성격검사 ② 적성검사
- ③ 흥미검사 ④ 사회성검사

47. 웨슬러 지능검사의 점수체계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아동용(WISC)과 성인용(WAIS) 검사의 지능지수 산출방식은 다르다.
- ② 동일한 원점수를 얻어도 연령에 따라 지능지수가 달라질 수 있다.
- ③ 11개 하위검사는 평균이 50점인 환산점수로 산출된다.
- ④ 언어성 지능과 동작성 지능의 평균과 표준편차는 다르다.

48. MMPI의 2(D)-7(Pt)척도가 상승한 패턴을 가진 피검자의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불안, 긴장, 과민성 등 정서적 불안 상태에 놓여 있다.
- ② 자기 비판 혹은 자기처벌적인 성향이 강하다.
- ③ 행동화(acting-out)하는 성향이 강하다.
- ④ 정신치료에 대한 동기는 높은 편이다.

49. GATB 직업적성검사의 하위검사에 포함되지 않는 것은?

- ① 기구 대조검사 ② 표식검사
③ 종전기입검사 ④ 운동기능검사

50. 웨슬러 지능검사의 특징이 아닌 것은?

- ① 동작성 검사를 포함한다.
② 집단용 검사이다.
③ 아동용 검사가 따로 있다.
④ 언어성 검사를 포함한다.

51. MMPI와 비교할 때 성격평가 질문지(PAI)의 특징이 아닌 것은?

- ① 문항의 수가 더 적다.
② 임상척도의 수가 더 적다.
③ 임상척도 이외에 대인관계 척도를 포함한다.
④ 4지 선다형이다.

52. 지능을 구성하는 요인에 관한 Cattell과 Horn의 이론 중 결정화된 지능(crystallizedintelligence)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 비언어적 요인과 관련된 능력을 말한다.
② 후천적이기보다는 선천적으로 이미 결정화된 지능의 측면을 말한다.
③ 나이가 들어감에 따라 낮아진다.
④ 문화적 요인에 의해 더 많은 영향을 받는다.

53. MMPI 타당도 척도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 무반응 점수(?)에서 높은 점수가 검사의 후반부 문항에서 응답하지 않는 것 때문이라면 임상척도에 미치는 영향이 그리 크지 않다.
② 허위척도(L)은 자신을 좋게 보이려고 다소 고의적으로 사소한 단점마저도 부인하는 세련되지 못한 방어를 평가한다.
③ 신뢰성 점수(F)가 T 65인 사람은 고의적으로 나쁘게 왜곡하여 대답했을 가능성이 있다.
④ 교정척도(K)는 방어성과 경계심을 평가한다.

54. 기억 장애를 보이고 있는 환자에게 기억 및 학습능력을 평가하는데 가장 적합한 것은?

- ① Trail Making Test ② SCL-90-R
③ Face-Hand Test ④ WMS-R

55. 직업지도를 하기 위하여 실시해야 할 표준화 검사는?

- ① 지능검사 ② 적성검사
③ 흥미검사 ④ 인성검사

56. 문장완성검사(SCT)에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 심사숙고하여 떠오르는 생각을 기록하도록 해야 한다.
② 인격 심층에 관한 정보를 알 수 있는 검사이다.
③ 완성되지 않은 문장을 완성하도록 되어 있는 투사검사 중의 하나이다.
④ 상상력과 창의력을 알아볼 수 있는 검사이다.

57. 23개월 유아가 연령에 비해 체격이 작고 아직도 걷는 것이 안정적이지 않으며, 말할 수 있는 단어가 '엄마, 아빠'로 제한되었다는 내용을 주 증상으로 내원하였다. 이 유아에게 실시할 수 있는 검사로 적합한 것은?

- ① 그림지능검사 ② 유아용 지능검사
③ 덴버 발달검사 ④ 빠아제식 지능검사

58. 다음 중 신경심리검사에 관한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

- ① 피검자의 인구통계학적 및 심리사회적 배경에 따라 반응이 달라진다.
② 신경심리평가에서는 전통적인 지적 기능평가와 성격평가는 필요하지 않다.
③ 정상인과 노인의 기능평가에는 사용되지 않는다.
④ 뇌손상은 단일한 행동지표를 나타낸다.

59. GATB 직업적성검사에서 검출되는 9개의 적성분야에 해당되지 않는 것은?

- ① 형태지각 ② 사무지각
③ 관계지각 ④ 손의 재치

60. 배터리 검사의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 평가되는 기능에 관한 자료가 종합적이다.
② 검사의 구성에 따라서 개개 환자의 원래 기능수준에 대한 평가가 가능하다.
③ 임상적 평가목적과 연구목적이 함께 충족될 수 있다.
④ 배터리 검사는 다양한 심리검사를 실시하는 심리사의 채용을 촉진한다.

4과목 : 임상심리학

61. 다음에 해당하는 심리학자의 윤리원칙은?

심리학자들은 부적절한 이중관계를 피하는데 모든 노력을 기울여야 한다.

- ① 유능성 ② 성실성
③ 사회적 책임 ④ 전문적이고 과학적인 책임

62. 다음 중 임상심리학의 역사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임상심리학의 발전에 최초로 가장 직접적인 공헌을 한 사람은 독일의 Wundt이다.
② 1910년대의 Witmer에 의해 표준화된 심리검사의 사용이 증가되었다.
③ Binet와 Simon은 1896년에 최초의 심리상담소를 설립하였다.
④ 임상심리학이 전문직으로서 인정을 받고 영역이 크게 확대된 계기는 제2차 세계대전이다.

63. 임상심리학자의 고유한 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사례관리 ② 심리평가
③ 심리치료 ④ 심리학적 자문

64. MMPI에서 각 임상척도의 평균과 표준편차로 옳은 것은?

- ① 평균 50, 표준편차 15
② 평균 50, 표준편차 10
③ 평균 100, 표준편차 15
④ 평균 100, 표준편차 10

65. MMPI 임상척도의 제작방식은?

- ① 내적 구조접근 및 요인분석
- ② 내적 내용접근 및 연역적 접근
- ③ 외적 준거접근 및 경험적 준거 타당도방식
- ④ 직관적 방식

66. 다음은 자문의 모델 중 무엇에 관한 설명인가?

- 자문가와 자문요청자 간에 보다 분명한 역할이 있다.
 - 자문가는 학습이론이 어떻게 개인, 집단 및 조직의 문제에 실질적으로 적용될 수 있는지를 가르치고 보여주는 인정된 전문가이다.
 - 문제해결에 있어 상호관계가 있을 수 있지만 행동지식 기반에 있어서 자문가와 자문요청자 사이에는 커다란 불균형이 있다.

- ① 정신건강모델 ② 행동주의모델
- ③ 조직모델 ④ 과정모델

67. 임상적 면접에서 사용되는 바람직한 의사소통 기술에 해당되는 것은?

- ① 면접자 자신의 사적인 이야기를 꺼내는데 주저하지 않는다.
- ② 침묵이 길어지지 않게 하기 위해, 면접자는 즉각 개입할 준비를 한다.
- ③ 폐쇄형보다는 개방형 질문을 주로 사용한다.
- ④ 내담자의 감정보다는 얻고자 하는 정보에 주목한다.

68. 자기보고형 성격검사를 실시한 결과 의도적 왜곡 가능성이 높아 결과해석에 어려움이 있다. 다음중 이러한 의도적 왜곡을 최소화할 수 있는 검사는?

- ① 지능검사 ② 신경심리검사
- ③ MBTI ④ 로사검사

69. 다음 중 임상심리사의 윤리기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임상심리사는 자신의 전문 영역 밖의 실무를 절대로 해서는 안 된다.
- ② 실시와 해석에 자격이 있는 사람만이 심리 평가도구를 사용할 수 있지만, 경우에 따라서는 자격없는 사람이 검사를 사용해도 무방하다.
- ③ 임상심리사는 전문적인 방식으로 치료적 관계를 구성해야 한다.
- ④ 임상심리사는 자신의 수련, 경험, 학위 및 활동들을 잘못 나타내는 공적 진술을 피해야 한다.

70. 다음 상담자에게 효율적인 치료를 위해 가장 필요한 것은?

심리치료 상담을 시행하는 사람은 정서적으로 보다 성숙되고 안정될 것을 요구받는다. 상담자는 자신의 개인적인 문제와 관련하여 지나치게 공격적인 내담자 또는 잠재적인 동성애 갈등을 지닌 내담자 등 특정 문제를 보이는 내담자와의 관계에서 악영향이 발생한다.

- ① 임상실습훈련 ② 지도감독
- ③ 개인적 심리치료 ④ 소양교육

71. 임상현장에 종사하면서 과학자-전문가모형 (scientist-practitioner model)에 충실하기 위한 이유 또는 방안과 거리가 먼 것은?

- ① 임상심리학의 주된 영역 중의 하나가 연구이므로, 임상심리학자는 임상현장에 적용 가능한 연구방법론을 개발하고, 그 기술과 기법에 능숙한 임상가가 되어야 한다.
- ② 대부분의 연구는 집단에 초점을 두고 개인차가 무시되어 개인적인 특성이 상실되므로, 실험분석은 질적 분석과 논리적인 일반화 작업을 증진시켜야 한다.
- ③ 임상심리학자는 일차적으로 과학자가 되어야 하며, 임상 실제 활동에 대한 타당도를 제공해야하고, 연구를 통해 이를 규명해야 한다.
- ④ 집단비교연구법은 임상적 의문점을 잘 해결해주어, 임상현장에 많은 기여를 하였다.

72. Beck의 우울증 인지행동치료에서 인지적 삼제(cognitive triad)에 해당되지 않는 것은?

- ① 자신 ② 과거
- ③ 세계 ④ 미래

73. 점수면접에서 반드시 확인되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인적사항
- ② 주 호소문제
- ③ 내원하게 된 직접적 계기
- ④ 주요 문제의 원인이 되는 것으로 추정되는 어린 시절의 외상경험

74. 다음 중 행동평가 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연관찰은 참여자가 아닌 관찰자가 환경 내에서 일어나는 참여자의 행동을 관찰하고 기록하는 방법이다.
- ② 유사관찰은 제한이 없는 환경에서 관찰하는 방법이다.
- ③ 참여관찰은 관찰하고자 하는 개인이 자연스런 환경에 관여하면서 기록하는 방식이다.
- ④ 자기관찰은 자신이 개인과 환경 간의 상호작용에 관한 자료를 수집하도록 한다.

75. 주의력 결핍-과잉행동장애(ADHD)는 상황을 종합적으로 분석하고, 목표를 계획하고, 실행하는 기능에 결함을 보인다고 한다. 뇌와 행동과의 관계에서 볼 때 어떤 부위의 결함을 시사하는가?

- ① 전두엽 손상 ② 측두엽의 손상
- ③ 변연계의 손상 ④ 해마의 손상

76. 다음 중 행동평가에서 강조하는 내용을 모두 짝지은 것은?

A. 행동평가는 행동주의 심리학 또는 행동치료에 이론적 근거를 두고 있다.
 B. 행동평가에서는 행동의 중요한 원인으로 특성을 강조한다.
 C. 행동평가에서는 문제행동뿐만 아니라 문제 행동이 일어나기 쉬운 특수한 자극 상황도 평가한다.
 D. 행동평가는 특수한 상황에서 나타나는 환자의 구체적인 행동, 사고, 감정 및 생리적 반응에 관한 자료를 수집한다.

- ① A ② A, C
③ A, C, D ④ A, B, C, D

77. Cormier와 Cormier가 제시한 적극적 경청 기술에 해당하지 않는 것은?

- ① 질문 ② 요약
③ 반영 ④ 명료화

78. 행동의학에서 두통치료에 가장 권장되는 심리적 기법은?

- ① 바이오 피드백과 이완 ② 심상훈련
③ 인지치료 ④ 주의전환

79. 술을 마시면 구토가 나는 약을 투약하여 알코올 중독 환자를 치료하는 행동치료기법은?

- ① 행동조성 ② 혐오치료
③ 자기표현훈련 ④ 환권보상치료

80. 자문역할을 수행함에 있어 행사조직, 부모나 내담자와의 동반자 관계 개발, 특정 내담자에 적합한 과정 찾기 등이 목표가 되는 자문모델은?

- ① 조직(인간관계) 모델 ② 조직(조직사고) 모델
③ 조직옹호모델 ④ 과정모델

5과목 : 심리상담

81. 노인상담에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상담자는 노인의 일반적인 의학적 상태에 주의를 기울인다.
② 상담자는 노년기의 전반적인 특성에 대한 지식을 갖추고 있어야 한다.
③ 고부 갈등과 같은 가족 간의 갈등 문제에서는 다른 가족 구성원의 참여로 도움을 받을 수 있다.
④ 노인은 다른 내담자와는 달리 보호가 더 필요하므로 상담자를 향한 의존을 허용한다.

82. 인터넷 중독의 상담전략 중 게임 관련 책자, 쇼핑 책자, 포르노 사진 등 인터넷 사용을 생각하게 되는 단서를 가능한 없애는 기법은?

- ① 자극통제법 ② 정서조절법
③ 공간재활용법 ④ 인지재구조화법

83. 다음은 사례관리의 단계 중 어디에 해당하는가?

- 상호목표를 정한다.
- 목표의 우선순위를 정한다.
- 전략을 세운다.
- 목표 달성을 위한 최선의 전략을 선택한다.

- ① 사정하기 ② 계획하기
③ 조정하기 ④ 철수하기

84. 산업장면에서 검사선택 시 고려사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 선발이나 승진 등의 의사결정 시에는 준거타당도를 검증한다.
② 검사의 선택은 후보가 될 만한 검사들을 폭넓게 찾아내고 검토한 후 이루어져야 한다.

③ 직무수행의 속성이 다차원적일 때는 복수 검사보다는 단일 검사를 선택한다.

④ 검사의 선택은 그 사용목적에 잘 부합하여야 한다.

85. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

Rogers가 제시한 바람직한 심리상담자의 태도 중 상담자가 내담자의 경험 또는 내담자의 사적인 세계를 상담자가 민감하게 그리고 정확하게 이해하려는 노력

- ① 공감 ② 진실성
③ 긍정적 존중 ④ 예민한 관찰력

86. 합리적-정서적 치료 상담의 ABCDE과정을 바르게 나열한 것은?

- ① 선행사건-신념체제-결과-논박-효과
② 신념체제-선행사건-결과-논박-효과
③ 결과-선행사건-신념체제-논박-결과
④ 논박-선행사건-신념체제-결과-효과

87. 상담이론 중 주로 겉으로 드러나는 내담자의 증상이나 장애 행동을 없애거나 바람직한 적응행동을 습득시키는 데 초점을 두는 상담접근법은?

- ① 인지치료 ② 행동치료
③ 정신분석치료 ④ 현실치료

88. 전화상담을 이용하는 내담자의 특성 및 상황과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부끄러움이 심하거나 대면상담을 꺼리는 상태
② 생활상의 이유로 직접 상담을 받으러 갈 수 없는 상황
③ 절망적인 상황으로 인식하여 자살을 시도하려는 순간 이야기하고 싶은 상태
④ 두려워하는 상황이나 자신의 핵심감정을 명료하게 이해하고 수용하는 상태

89. 합리적-정서적 치료에서 제시하는 비합리적 생각 중에 「자기 자신이 시도하는 일은 결과적으로 제대로 되지 않을 것」이라고 믿는 생각은 어디에 해당되는가?

- ① 당위성 ② 과잉 일반화
③ 절대적 사고 ④ 부정적 예언

90. 내담자들이 보이는 행동이나 사고를 체계적으로 측정하는 방법으로 개인의 자연환경에서 행동을 평가하기 위해 내담자로 하여금 스스로 자신의 행동을 관찰하고 주간행동기록표, 일일활동일지, 자동적 사고 기록지 등을 작성하도록 하는 방법은?

- ① 임상적 면담법(clinical interview)
② 자기보고형 검사(self-report test)
③ 자기감찰(self-monitoring)
④ 생리적 측정법(physiological measurement)

91. 성폭력 피해자 심리상담 초기단계의 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 치료관계 형성에 힘써야 한다.
② 상담자는 상담내용의 주도권을 가져야 한다.
③ 성폭력 피해로 인한 합병증이 있는지 묻는다.

- ④ 성폭력 피해의 문제가 없다고 부정을 하면 일단 수용해 준다.
92. 다음 중 심리상담에서 경청의 방해 요인이 아닌 것은?
- ① 상대방의 말에 포함된 단서를 포착하여 감정을 읽어주고 반응을 확인하는 것
 - ② 상대방에게 전적으로 주의를 기울이기보다는 자기가 다음에 할 말을 생각하고 있는 것
 - ③ 자신의 역할이나 자기가 상대방에게 어떻게 보이느냐에 대하여 지나치게 신경을 쓰는 것
 - ④ 자신을 타인의 위치에 두는 공감적인 태도 없이 상대를 편견으로 판단하고 평가하는 것
93. 다음 중 집단상담의 장점과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 심리적으로 상처를 입을 가능성이 줄어들어 치료속도가 빠르다.
 - ② 다양한 성격의 소유자들과 접할 수 있다.
 - ③ 시간과 비용면에서 경제적이다.
 - ④ 새로운 행동을 현실 검증해 볼 수 있는 기회를 제공한다.
94. 게슈탈트 심리치료에서 강조하는 것이 아닌 것은?
- ① 지금-여기
 - ② 내담자의 억압된 감정에 대한 해석
 - ③ 미해결 과제와 회피
 - ④ 환경과의 접촉
95. 정신분석적 상담접근에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 정신분석에서는 꿈을 활용한다.
 - ② 정신분석에서 내담자의 저항은 중요하지 않다.
 - ③ 내담자와 상담가의 관계는 전이과정으로 개념화된다.
 - ④ 정신분석적 치료의 목표는 무의식을 의식화하고 자아를 강하게 하는 데 있다.
96. 자기가 화가 난 것을 의식하지 못하고 상대방이 자기에게 화를 냈다고 생각하는 것은?
- ① 승화 ② 투사
 - ③ 부정 ④ 퇴행
97. 다음 중 접수면접에서 자살의도를 보고한 내담자에게 취해야 할 조치로 옳은 것은?
- ① 자살의도에 대하여 그 다음 회기 때도 내담자에게 묻는다.
 - ② 즉시 경찰에 알린다.
 - ③ 주 호소만을 다룬다.
 - ④ 차트에 적고 내담자의 사인을 받아 놓는다.
98. 신체적 장애 발생 시 거치는 심리적 적응단계에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 초기에 외상 자체를 부정하는 것은 회복 과정을 방해하게 된다.
 - ② 장애나 질병의 심각성과 정도를 이해하고 완전히 인정하게 될 때에는 우울해진다.
 - ③ 독립적으로 자기간호와 재활의 노력이 가능할 때 나타나는 반작용이 독립에 대한 저항이다.
 - ④ 충격은 외상 시 나타나는 즉각적인 반응이다.

99. 다음 중 집단상담자의 역할과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 느낌보다는 지적인 측면에 관심을 불러일으킨다.
 - ② 집단활동의 시작을 돕는다.
 - ③ 집단의 방향을 제시하고 집단규준을 발달시킨다.
 - ④ 의사소통 및 상호작용을 촉진시킨다.

100. 다음에 제시된 집단상담의 일반적인 과정을 바르게 나열한 것은?

A. 구성원들에게 왜 이 집단에 들어오게 되었는지를 분명히 이해시키고, 서로 친숙해지도록 도와준다.

B. 상담자와 집단성원들은 집단과정에서 배운 것을 미래의 생활에서 어떻게 적용할 것인가 생각한다.

C. 집단성원들이 자기의 문제를 집단에서 논의하며 바람직한 행동 변화를 모색한다.

D. 집단과정 동안에 일어나는 저항, 방어 등을 자각하고 정리하도록 도와준다.

- ① A → B → C → D ② A → D → B → C
- ③ A → D → C → B ④ C → B → A → D

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ③ | ③ | ② | ④ | ② | ③ | ④ | ③ | ④ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③ | ③ | ④ | ④ | ③ | ④ | ① | ④ | ③ | ① |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ① | ② | ④ | ③ | ④ | ② | ① | ① | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ④ | ① | ③ | ④ | ④ | ③ | ① | ① | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ④ | ③ | ④ | ④ | ② | ② | ③ | ④ | ② |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ④ | ③ | ④ | ② | ③ | ③ | ① | ③ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ④ | ① | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ② | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ② | ④ | ② | ① | ③ | ① | ① | ② | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ① | ② | ③ | ① | ① | ② | ④ | ④ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ① | ① | ② | ② | ② | ① | ① | ① | ③ |