

## 1과목 : 심리학개론

1. Fishbein의 합리적 행위이론(Reasoned Action Theory)에 의하면 행위의도는 행위에 대한 태도( $A_B$ )와 무엇에 의해 결정된다고 하는가?

- ① 주관적 사회규범(SN)
- ② 주위 사람의 뜻에 동조하려는 동기(MC)
- ③ 행위로 인해 얻게 될 보상(b)
- ④ 자신이 가치롭다고 생각하는 속성(NB)

2. 다음 중 기억정보가 아날로그 방식으로 표상됨을 나타내는 예는?

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| ① 심적회전    | ② 마디(Node)와 연결로(Link) |
| ③ 디지털 컴퓨터 | ④ 명제                  |

3. 다음이 설명하는 개념은?

학교에서 강의를 듣는 학생이 강의를 받던 곳에서 시험을 치루면 강의를 받지 않은 다른 곳에서 시험을 보는 것보다 시험결과가 좋마질 수가 있다.

- |          |           |
|----------|-----------|
| ① 처리수준모형 | ② 부호화특정원리 |
| ③ 재인기억   | ④ 우연학습    |

4. 자극추구(Sensation-Seeking) 성향에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① Eysenck는 자극추구성향에 관한 척도를 제작했다.
- ② 자극추구 성향이 높을수록 노아에피네프린(NE)이라는 신경전달물질을 통제하는 체계에서의 흥분수준이 낮다는 주장이 있다.
- ③ 성격특성이 일부 신체적으로 유전된다고 하는 주장을 반박하는 근거로 제시된다.
- ④ 내향성과 외향성을 구분하는 생리적 기준으로 사용된다.

5. Carl Rogers의 성격이론에서 심리적 적응에 가장 중요한 역할을 한다고 가정하는 것은?

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ① 자아강도(ego strength) | ② 자기(self)      |
| ③ 자아이상(ego ideal)    | ④ 인식(awareness) |

6. 다음 중 온도나 지능검사의 점수를 측정할 때 사용되는 척도는?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 명목척도 | ② 서열척도 |
| ③ 등간척도 | ④ 비율척도 |

7. Piaget의 인지 발달 이론 단계 중 전조작기 단계의 아동이 보이는 사고의 주된 특징은?

- ① 대상영속성 개념의 결핍
- ② 감각운동 도식에 의해 세상 이해
- ③ 자아중심성
- ④ 부분-전체 관계에 대한 통찰

8. 다음 중 성격이론에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Allport: 성격은 과거 경험에 의해 학습된 행동성향으로, 상황이 달라지면 행동성향도 변화한다.
- ② Cattell: 특질을 표면특질과 근원특질로 구분하고, 자료의

통계 분석에 근거하여 16개의 근원 특질을 제시했다.

- ③ Rogers: 현실에 대한 주관적 해석 및 인간의 자기실현과 성장을 위한 욕구를 강조했다.
- ④ Freud: 본능적인 측면을 지나치게 강조하여 사회환경적 요인을 상대적으로 경시했다.

9. 다음 중 기억에서 입력된 정보 속성의 유사성에 따라서 망각이 일어나는 것은?

- |        |      |
|--------|------|
| ① 쇠퇴   | ② 대치 |
| ③ 인출실패 | ④ 간섭 |

10. 다음 중 고전적 조건형성과 관계가 없는 것은?

- |                      |
|----------------------|
| ① Pavlov의 개의 소화과정 연구 |
| ② 고차적 조건형성           |
| ③ 자극일반화와 변별          |
| ④ 미신적 행동과 학습된 무력감    |

11. 다음 중 의미망 모형에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 많은 정보들은 의미망으로 조직화할 수 있고 의미망은 노드(node)와 통로(pathway)로 구성되어 있다.
- ② 모형의 가정을 어휘결정과제로 검증할 수 있다.
- ③ 이 모형에 따르면 버터가 단어인지를 판단하는데 걸리는 시간은 간호원보다 빤이라는 단어가 먼저 제시되었을 때 더 느린다.
- ④ 활성화 확산 과정으로 설명할 수 있다.

12. Kohlberg의 도덕적 발달단계에서 인습적 수준에 해당하는 단계는?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ① 보상지향단계       | ② 상호조화를 지향하는 단계 |
| ③ 벌 및 복종 지향 단계 | ④ 보편적인 도덕원리 지향  |

13. 집단으로 일을 수행할 때, 혼자 일할 때보다 더 적은 노력을 들이는 현상은?

- |          |          |
|----------|----------|
| ① 사회적 측진 | ② 사회적 동조 |
| ③ 집단적 극화 | ④ 사회적 태만 |

14. 정신분석에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Freud는 정신결정론과 무의식적 동기를 강조한다.
- ② Jung은 집단무의식의 중요한 구성요소를 원형이라 가정한다.
- ③ Adler는 생물학적 측면보다는 사회적 요인이 성격에 미치는 영향을 강조한다.
- ④ 적응적인 성격이란 3가지 성격요소 중 어느 한 요소가 지배적이고 다른 두 요소가 조화를 이루는 경우이다.

15. 성취행동에 대한 개인유형 중 내부적이면서 불안정한 것은?

- |          |      |
|----------|------|
| ① 과제 난이도 | ② 능력 |
| ③ 운      | ④ 노력 |

16. 다음 중 모집단의 범위와 변산도를 가장 잘 설명하는 통계 방법은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 평균편차 | ② 범위   |
| ③ 표준편차 | ④ 상관계수 |

17. 하나를 보면 열을 안다는 속담처럼 타인을 지각할 때 내적으로 일관되게 평가하는 경향은?

- |        |          |
|--------|----------|
| ① 후광효과 | ② 긍정적 편파 |
|--------|----------|

- ③ 자기이행적 예언      ④ 단순접촉효과

**18. 아동기의 애착에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 유아가 엄마에게 분명한 애착을 보이는 시기는 생후 3~4 개월경부터이다.
- ② 엄마와의 밀접한 신체접촉이 애착을 형성하는데 가장 중요한 역할을 한다.
- ③ 애착은 인간 고유의 현상으로서 동물들에게는 유사한 현상을 찾아보기 어렵다.
- ④ 안정적으로 애착된 아동들은 엄마가 없는 낯선 상황에서도 주위를 적극적으로 탐색한다.

**19. 설득은 어떤 사람의 명시적인 요청에 대한 반응으로 일어나는 행동변화인데, 다음 중 설득을 일으키는 기법이 아닌 것은?**

- ① 문간에 발 들여놓기 효과(foot-in-the-door effect)
- ② 인지부조화이론(cognitive dissonance theory)
- ③ 낮은 공 절차(lowball procedure)
- ④ 면전에서 문 닫기 효과(door-in-the-face effect)

**20. 임상심리학 연구방법 중 내담자와의 면접을 통해 증상과 경과를 체계적으로 연구하는 방법은?**

- ① 실험연구      ② 상관연구
- ③ 사례연구      ④ 혼합연구

**2과목 : 이상심리학**

**21. 외상적 사건에 대한 기억과 연관된 불안을 감소시키는데 초점을 맞추고 있으며, Foa에 의해 개발된 이후 외상 후 스트레스 장애에 대해 경험적으로 지지된 치료로서 학계로부터 널리 인정을 받고 있는 치료법은?**

- ① 불안조절 훈련      ② 안구운동 둔감화와 재처리 치료
- ③ 지속노출치료      ④ 인지적 처리치료

**22. 행동주의적 견해에 따르면 강박행동은 어떤 원리에 의해 유지되는가?**

- ① 고전적 조건형성      ② 부적 강화
- ③ 소거      ④ 모델링

**23. 다음 중 정신분열증의 하위유형에 해당하지 않는 것은?**

- ① 미정형      ② 중복형
- ③ 긴장형      ④ 망상형

**24. 자폐성장애는 아동기에 발병하는 정신분열증과 어떻게 다른가?**

- ① 자폐성장애는 사회적으로 철회되어 있고 부적절한 정동 상태를 보인다.
- ② 정신분열 아동들은 종종 정신지체도 보인다.
- ③ 자폐성장애는 망상과 환각을 보이지 않는다.
- ④ 아동기에 발병하는 정신분열증은 없다.

**25. 출생 후 2년 동안은 정상적인 발달이 이루어지다가 그 후에는 자폐증과 유사한 증상을 나타내는 아동기 정신장애는?**

- ① 아스퍼거 장애      ② 주의력 결핍 및 과잉행동 장애
- ③ 소아기 불교성 장애      ④ 뚜렷 장애

**26. 다음 중 노출증(Exhibitionism)에 관한 설명으로 틀린 것은?**

- ① 성도착적 초점은 낯선 사람에게 성기를 노출시키는 것이다.

- ② 성기를 노출시켰다는 상상을 하면서 자위행위를 하기도 한다.

- ③ 보통 18세 이전에 발생하며, 40세 이후에는 상태가 완화되는 것으로 보인다.

- ④ 노출증적 행동을 나타내는 경우에 대개 낯선 사람과 성행위를 하려고 시도한다.

**27. 정신분석학적 관점에서 볼 때 해리성 장애 환자들에게서 가장 흔히 나타나는 방어기제는?**

- |      |        |
|------|--------|
| ① 억압 | ② 반동형성 |
| ③ 전치 | ④ 주지화  |

**28. 범불안장애를 보이는 사람의 인지적 특징과 가장 거리가 먼 것은?**

- ① 잠재적 위험에 예민하다.
- ② 잠재적 위험이 발생할 확률을 높게 평가한다.
- ③ 타인으로부터 이용당할 가능성에 민감하다.
- ④ 사건이 발생할 경우 자신의 대처능력을 과소평가한다.

**29. “외모가 중요해”, “나는 언제나 다른 사람의 주의를 끌어야 해”, “감정은 즉각적으로 직접 표현해야 해” 등과 같은 인지도식을 가진 성격장애는?**

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ① 편집성 성격장애  | ② 히스테리성 성격장애 |
| ③ 자기애성 성격장애 | ④ 강박성 성격장애   |

**30. 다음 중 정신분열병의 음성증상의 예를 모두 짹지는 것은?**

- |             |
|-------------|
| A. 피해망상     |
| B. 표정 없는 얼굴 |
| C. 말미 느낌    |
| D. 환청       |

- |        |           |
|--------|-----------|
| ① A, B | ② B, C    |
| ③ C, D | ④ A, B, C |

**31. 정신지체 아동에 대한 적합한 치료전략과 가장 거리가 먼 것은?**

- ① 가벼운(mild) 수준의 지체 아동은 9세 경에 자신의 몸짓을 할 수 있고 이웃 사람들과 일상적인 대화를 할 수 있는 수준의 교육훈련 목표를 세운다.
- ② 중간(moderate) 수준의 지체아동은 15세 경에 식사와 목욕을 혼자 할 수 있을 정도의 교육훈련 목표를 세운다.
- ③ 심한(severe) 수준의 지체아동은 15세 경에 혼자서 식사를 하고 옷을 입을 수 있는 수준의 교육훈련 목표를 세운다.
- ④ 극심한(profound) 수준의 지체아동은 15세 경에 혼자서 식사를 하고 작은 단추와 지퍼를 제외한 옷을 입을 수 있는 정도의 교육훈련 목표를 세운다.

**32. 다음 인지장애 중 DSM-IV의 치매 진단 기준에 해당되지 않는 것은?**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ① 실행증(apraxia) | ② 실어증(aphasia) |
| ③ 실인증(agnosia) | ④ 섬망(delirium) |

**33. 여성의 알코올 중독에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 알코올 중독의 남녀 비율은 비슷한 수준이다.  
 ② 여성은 유전적으로 남성보다 알코올 중독의 가능성이 더 높다.  
 ③ 여성 알코올 중독자들은 남성 알코올 중독자들보다 우울을 더 많이 경험하고 자살시도 횟수가 더 많다.  
 ④ 여성은 남성보다 체지방이 많기 때문에 술의 효과가 늦게 나타나고 대사가 빠르다.

## 34. 다음과 같은 증상의 진단으로 가장 적합한 정신장애는?

A군은 어렸을 때부터 말을 알아듣는 것이나 말하는 것이 몹시 느려서 다른 사람을 대하면 자기를 바보로 여기는 것 같아 예민하게 반응하였으며 조금만 자기에게 소홀하면 자기를 따돌리고 바보 취급하는 것으로 받아들였다. 대학에 들어와서도 다른 학생들이 자기와 함께 하지 않으면 자기를 무시하고 바보 취급한다고 생각하여 자주 싸우려고 하고, 실제로 싸울 때도 많았다. 자신은 언제나 높고 다른 사람을 위하려 하는데 주위의 사람은 언제나 자기를 해치려 하고 무시하려 한다고 화를 낸다. 그는 친구관계가 아주 빈약하며 타인을 의심하고 경계한다.

- ① 정신병질                    ② 편집성 성격장애  
 ③ 기분장애                    ④ 사회공포증

## 35. 다음 중 삼환식 항우울제의 부작용이 아닌 것은?

- ① 입이 마름                    ② 변비  
 ③ 시야 흐림                    ④ 체중감소

## 36. 기분장애의 “카테콜라민(catecholamine) 가설”的 설명으로 옳은 것은?

- ① 정신분열증이 도파민의 부족에 기인한다는 입장  
 ② 우울증이 노아에피네프린의 부족에 기인한다는 입장  
 ③ 우울증이 생물학적 및 환경적 원인의 상호작용에 기인한다는 입장  
 ④ 조증이 세로토닌의 증가에 기인한다는 입장

## 37. 다음 중 자폐증의 주요증상이 아닌 것은?

- ① 사회적 상호작용에서의 질적인 장애  
 ② 과잉행동과 충동성  
 ③ 의사소통에서의 질적인 장애  
 ④ 행동이나 관심에서의 반복적이며 상동적인 증상

## 38. 다음 중 정신분열증 발병의 원인으로서 도파민 가설을 지지하는 증거가 아닌 것은?

- ① 도파민 억제제들이 정신분열증 치료에 효과가 있다.  
 ② 정신분열증 치료약물들이 도파민 부족이 원인으로 알려진 Parkinson씨 병 증상을 일으킨다.  
 ③ 파킨슨씨 병 치료약물인 L-Dopa가 어떤 사람들에게 정신분열증과 유사한 증상을 일으킨다.  
 ④ 도파민을 활성화시키는 Amphetamine이 정신분열증 환자들의 증상을 완화시킨다.

## 39. 다음 중 반항성장애(Oppositional Defiant Disorder)로 진단 받은 아동에게서 관찰할 수 있는 행동은?

- ① 자신도 모르게 쉴 사이 없이 눈을 깜빡거리거나 일정한 몸짓을 하며 때로는 괴상한 소리를 내기도 한다.  
 ② 엄마와 떨어지는 것에 대한 불안으로 학교 가기를 거부한다.  
 ③ 사회적으로 정해진 규칙을 위반하거나 타인의 권리를 침해한다.  
 ④ 어른들과 논쟁을 하고 쉽게 화를 낸다.

## 40. 성기능 장애의 하나로서 남성이 사정에 어려움을 겪으며 성적 절정감을 느끼지 못하는 장애는?

- ① 조루증                    ② 지루증  
 ③ 남성 발기장애            ④ 성교 통증장애

## 3과목 : 심리검사

## 41. 시각-공간적 기능손상이 있는 노년상 환자에게 특히 어려운 과제는?

- ① 산수문제                    ② 빠진 곳 찾기  
 ③ 차례 맞추기                    ④ 토막 짜기

## 42. 다음 중 실행적 기능(executive function)을 담당하는 뇌 부위가 손상된 환자의 평가결과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 벤더도형검사(BGT)에서 도형의 배치 순서를 평가하는 항목의 점수가 유의하게 낮다.  
 ② 웨슬러 지능검사에서 차례맞추기 소검사의 점수가 유의하게 낮았다.  
 ③ Stroop test의 간섭시행 단계에서 특히 점수가 낮았다.  
 ④ 웨슬러 지능검사에서 기본지식 소검사의 점수가 유의하게 낮았다.

## 43. 다음 중 성격검사의 구성타당도를 평가하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 성격검사의 요인을 분석한다.  
 ② 다른 유사한 성격을 측정하는 검사와의 상관을 구한다.  
 ③ 관련 없는 성격을 측정하는 검사와의 상관을 구한다.  
 ④ 전문가들로 하여금 검사 내용을 판단하게 한다.

## 44. MMPI를 해석하는데 있어서 피검자의 검사태도 및 프로파일의 타당도를 알아보기 위해 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검사 수행에 걸린 시간                    ② 무응답의 개수  
 ③ F 척도의 상승도                            ④ Pa 척도의 변화폭

## 45. 심리평가를 위한 면담기법 중 비구조화된 면담 방식의 장점에 해당하는 것은?

- ① 면담자 간의 진단 신뢰도를 높일 수 있다.  
 ② 연구 장면에서 활용하기가 용이하다.  
 ③ 중요한 정보를 깊이 있게 탐색할 수 있다.  
 ④ 점수화하기에 용이하다.

## 46. 다음 중 MMPI 코드 쌍의 해석적 의미로 틀린 것은?

- ① 4-9 : 행동화적 경향이 높다.  
 ② 1-2 : 다양한 신체적 증상에 대한 호소와 염려를 보인다.  
 ③ 2-6 : 전환증상을 나타낼 경우가 많다.  
 ④ 3-8 : 사고가 본질적으로 망상적일 수 있다.

47. 다음 중 베일리 발달척도(BSID-II)를 구성하는 하위 척도가 아닌 것은?

- ① 정신척도(mental scale)
- ② 사회성 척도(social scale)
- ③ 행동평정척도(behavior rating scale)
- ④ 운동척도(motor scale)

48. 동일한 사람에게 교육 수준이나 환경의 영향, 질병의 영향 등과 같은 모든 가외 변인을 통제한 상태에서 20세, 30세, 40세 때 편차 점수를 사용하는 동일한 지능검사를 실시하였다면 지능이 어떻게 나타날 것인가?

- ① 점진적인 저하가 나타난다.
- ② 30세 때 까지 상승하다가 그 이후 저하된다.
- ③ 점진적인 상승이 나타난다.
- ④ 변하지 않는다.

49. 조직에서 직원을 선발할 때 적성검사를 사용하는 경우, 적성검사의 준거관련타당도는 어떻게 구하는 것이 가장 바람직한가?

- ① 적성검사와 직원이 입사 후 이들의 직무수행점수와의 상관을 구한다.
- ② 적성검사와 다른 선발용 검사와의 상관을 구한다.
- ③ 적성검사의 요인을 분석한다.
- ④ 적성검사의 내용을 전문가들이 판단하도록 한다.

50. MMPI 임상척도 중 점수가 지나치게 하강하는 경우도 점수가 상승하는 것과 같은 의미로 해석하기도 하는 척도는?

- ① 척도 2
- ② 척도 4
- ③ 척도 6
- ④ 척도 8

51. 문장완성검사(senstence completion test : SCT)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 심사숙고하여 떠오르는 생각을 기록하도록 해야 한다.
- ② 인격 심층에 관한 정보를 알 수 있는 검사이다.
- ③ 완성되지 않은 문장을 완성하도록 되어 있는 투사검사중의 하나이다.
- ④ 상상력과 창의력을 알아볼 수 있는 검사이다.

52. 다음 중 Guilford의 지능구조 입체모형설의 구성내용에 포함되지 않는 것은?

- ① 내용(content)
- ② 소산(product)
- ③ 조작(operation)
- ④ 파지(retention)

53. 다음 ( ) 안에 들어갈 알맞은 것은?

지능검사가 개인의 일반적인 능력을 측정하는 것이 라면, ( )는 특정학업과정이나 직업에 대한 앞으로의 수행능력과 적응도를 예측하는 검사를 말한다.

- ① 창의성 검사
- ② 성취도 검사
- ③ 적성검사
- ④ 발달검사

54. 다음 중 BGT(Bender Gestalt Test)의 장점에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적절하게 말할 수 있는 능력이 없거나, 말할 수 있는 능

력은 있으나 얘기를 하기 싫어할 때 유용하다.

- ② 피검자가 말로 의사소통할 능력이 충분히 있더라도 언어적 행동으로 성격의 강점과 약점에 관한 정보를 얻기 힘들 때 유용하다.
- ③ 뇌기능에 장애가 있는 피검자에게 유용하다.
- ④ 자기 자신을 과장되게 표현하려는 피검자에게 유용하다.

55. 다음 중 Wechsler가 제시한 지능의 정의에 해당되는 것은?

- ① 지능은 판단하고 이해하고 추론하는 능력이다.
- ② 지능은 목표를 가지고 행동하고 합리적으로 사고하며, 환경을 효과적으로 다룰 수 있는 능력의 집합이다.
- ③ 지능은 유전자에 의해 전수되는 타고난 능력이다.
- ④ 사회문화적 경험이나 조건 형성된 능력으로써 적응능력을 말한다.

56. 다음 중 뇌손상으로 인해 기능이 떨어진 환자를 평가하고자 할 때 흔히 부딪힐 수 있는 환자의 문제와 가장 거리가 먼 것은?

- |        |          |
|--------|----------|
| ① 시력장애 | ② 주의력 저하 |
| ③ 동기저하 | ④ 피로     |

57. 다음 중 MMPI에서 F 척도가 매우 높을 때의 가능한 해석과 가장 거리가 먼 것은?

- |               |            |
|---------------|------------|
| ① 전형적인 신경증 증상 | ② 무선적인 반응  |
| ③ 심한 정서적 혼란   | ④ 부정 왜곡 경향 |

58. 개인용 지능검사(K-WAIS)에서 편차 지능지수(deviation IQ)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 편차지능지수는 모집단의 평균을 100, 표준편차를 15로 규정한 정상분포곡선상의 표준점수이다.
- ② 어느 개인의 편차지능지수가 100이라면, 지능수준으로 볼 때, 그 개인은 동일 연령의 모집단 내에서 중간 정도의 위치에 있다.
- ③ 평균을 100, 표준편차를 15로 규정한 편차지능지수인 경우, IQ 70은 표준편차 -2의 위치에 해당되는 지능지수이다.
- ④ 편차지능지수 100을 다른 표준점수로 환산한다면, Z점수로는 1, T점수로는 50에 각각 해당된다.

59. K-WAIS에서 어휘검사의 측정내용으로 옳은 것은?

- ① 일반 지능의 주요 지표
- ② 개인이 소유한 기본 지식의 정도
- ③ 수 개념의 이해와 주의 집중력
- ④ 사물의 본질과 비본질을 구분하는 능력

60. 다음 중 성취도 검사의 일종인 기초학습기능검사가 평가하기 어려운 영역은?

- ① 독해력
- ② 공간추론 능력
- ③ 계산 능력
- ④ 철자법 능력

#### 4과목 : 임상심리학

61. 다음과 같은 자문의 유형은?

주의력 결핍장애를 가진 마동의 혼란된 행동을  
다루는 방법을 확신하지 못하고 있는 초등학교  
3학년 담임교사에게 자문을 해주었다.

- ① 내담자 중심 사례 자문    ② 프로그램 중심 행정 자문  
 ③ 피자문자 중심 사례 자문    ④ 피자문자 중심 행정 자문
62. 면접 시 임상가가 어떻게 질문을 하느냐에 따라 내담자로부터 유용한 정보를 얻을 수 있느냐가 결정된다. 다음의 질문 형태 중 내담자로부터 많은 정보를 얻어내는데 효과적인 질문방식으로만 짹지어진 것은?
- A. 개방형 질문  
 B. 폐쇄형 질문  
 C. 간접형 질문  
 D. 직접적 질문
- ① A, B                      ② A, C  
 ③ B, C                      ④ B, D
63. 정신건강전문가인 정신과 의사, 간호사, 사회복지사의 역할과는 구분되는 임상심리학자만의 전통적 역할로 강조되는 것은?  
 ① 심리치료 및 상담  
 ② 심리검사를 통한 평가  
 ③ 정신질환에 관한 예방적 노력  
 ④ 개인 개업 또는 집단 개업
64. 다음 중 심리치료에 관한 연구결과로 옳은 것은?  
 ① 모든 문제들은 똑같이 치료가 어렵다.  
 ② 장기치료와 단기치료의 치료효과의 차이규명은 어렵다.  
 ③ 사회경제적 지위나 교육수준이 치료의 중도탈락을 예언하기는 어렵다.  
 ④ 치료자의 기술이 중도탈락을 예언하기는 어렵다.
65. 다음 중 자문의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 자문가와 피자문자의 관계는 임의적이다.  
 ② 자문가는 자문을 요청한 기관과 관련이 있다.  
 ③ 자문가는 피자문자의 기능적 역량에 중점을 둔다.  
 ④ 자문가는 피자문자를 대신하여 내담자를 치료한다.
66. 심리상담 및 치료의 과정에서 나타나는 현상과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 내담자는 상담자가 아무런 요구 없이 인간으로서의 관심만을 베푸다는 것을 경험한다.  
 ② 상담관계에서 내담자는 처음부터 새로운 방식으로 반응하고 행동하게 된다.  
 ③ 상담 장면에서는 일반적이고 추상적인 자료보다는 그 상황에서의 실제행동을 다룬다.  
 ④ 치료유형에 차이가 있음에도 불구하고 심리치료에는 공통요인이 작용한다.
67. 심리검사를 실시하거나 면접을 시행하는 동안 임상심리학자가 취해야 할 태도와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 행동관찰에서는 다른 사람 또는 다른 장면에서는 관찰할 수 없는 비일상적 행동이나 그 환자만의 특징적인 행동을 주로 기술한다.  
 ② 관찰된 행동을 기술할 때에는 어떤 상황에서 어떤 방식으로 불안을 나타내는지를 구체적 용어로 설명하는 것이 바람직하다.  
 ③ 정상적인 적응을 하고 있는 사람들도 심리검사와 같은 생소한 상황에 직면할 때는 여러 가지 특징적인 행동을 나타내게 되는데 이러한 일반적인 행동까지 평가보고서에 포함시키는 것이 좋다.  
 ④ 평가보고서에는 주로 환자의 특징적인 행동과 심리검사 결과뿐만 아니라 외모나 면접자에 대한 태도, 의사소통 방식, 사고, 감정 및 과제에 대한 반응에서 특징적인 내용까지 포함시키는 것이 좋다.
68. 임상심리학자로서 지켜야 할 내담자에 대한 비밀보장에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 일반적으로 상담과정에서 내담자에 대해 알게 된 사실을 다른 사람들에게 말하면 안 된다.  
 ② 아동 내담자의 경우에도 아동에 관한 정보를 부모에게 알려서는 안 된다.  
 ③ 자살 우려가 있는 경우 내담자의 비밀을 지키는 것보다는 가족에게 알려 자살예방 조치를 취하는 것이 더 중요하다.  
 ④ 상담 도중 알게 된 내담자의 중요한 범죄사실에 대해서는 비밀을 지킬 필요가 없다.
69. 심리사회적 또는 환경적 스트레스와 조합된 생물학적 또는 기타 취약성이 질병을 일으킨다는 것은?  
 ① 상호적 유전-환경 조망    ② 병적 소질-스트레스 조망  
 ③ 사회적 조망                      ④ 생물학적 조망
70. 임상심리사가 개인적인 심리적 문제를 갖고 있다든지, 너무 많은 부담 때문에 지쳐있다든지, 교만하여 더 이상 배우지 않고 배울 필요가 없다고 생각하거나, 해당되는 특정 전문교육수련을 받지 않고도 특정 내담자군을 잘 다룰 수 있다고 여긴다면, 이는 다음 중 어느 항목의 윤리적 원칙에 위배되는 것인가?  
 ① 유능성                      ② 성실성  
 ③ 권리의 존엄성              ④ 사회적 책임
71. 인지치료에서 강조하는 내용과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 내담자로 하여금 자신의 신념들을 파악하게 한다.  
 ② 내담자의 비합리적 생각을 변화시키기 위하여 논리적인 분석을 한다.  
 ③ 내담자의 미해결된 과제를 지금-여기서 해결하도록 노력 한다.  
 ④ 내담자는 자기의 문제를 이해하고 해결할 수 있는 자각 능력과 의식기능을 가지고 있으므로 지시적이고 능동적이며 구조적 접근을 실시한다.
72. 다음 중 뇌의 편측성 효과를 탐색하는 방법은?  
 ① 뇌파검사                      ② 동물외과술  
 ③ 신경심리검사                      ④ 이원청취기법
73. 다음 중 인지 -행동적 상담에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 공포상황에서의 노출과 같은 행동기법이 인지기법에 동반되어 사용된다.  
 ② 역기능적인 도식과 기대를 기능적으로 수정하는데 치료 목표를 둔다.  
 ③ 세계에 대한 개인의 지각과 자신의 경험세계를 강조하여 자기-실현의 추구를 가정한다.  
 ④ 자동적 사고의 탐지와 평가가 중요한 초점이 된다.
74. 다음 중 반응성 효과가 적고 관찰자로 하여금 광범위한 자연 장면에서 행동을 기록할 수 있도록 해주기 때문에 생태학적 타당도를 높일 수 있는 행동평가 방법은?

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <p>① 자기-감찰<br/>③ 비참여관찰</p> | <p>② 참여관찰<br/>④ 행동평가 면접</p> |
|----------------------------|-----------------------------|

## 75. 뇌의 부위와 행동과의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우측 측두엽 손상 - 기억, 추리, 판단 등 고차적 인지 기능에 결함
- ② 변연계의 손상 - 주로 시지각과 시각학습에서의 결함
- ③ 전두엽의 손상 - 언어표현의 결함
- ④ 후두엽의 손상 - 시각적 공간의 즉각보고의 손상

## 76. 신경심리학적 기능을 연구하는 방법 중 비침입적인 방법에 해당하는 것은?

- ① 양전자방출단층촬영(PET)
- ② WADA 검사
- ③ 심전극(Depth electrode)
- ④ 뇌파(EEG)

## 77. 언어적 기능과 시·공간적 기능을 담당하는 반구 간에 차이가 있는 것을 통해 대뇌 기능의 편재화를 알 수 있다. 다음 중 대뇌 기능의 편재화를 평가하는데 사용하는 검사가 아닌 것은?

- ① 손잡이(handedness)검사
- ② 주의력검사
- ③ 발잡이(footedness)검사
- ④ 눈의 편향성 검사

## 78. 임상심리학의 역사에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① Pennsylvania 대학교에 심리진료소를 설립한 것이 임상심리학의 탄생에 결정적 역할을 하였다.
- ② 1차 세계대전 당시 군인선발을 위한 심리검사의 개발은 임상심리학의 발전에 크게 기여하였다.
- ③ 임상심리학의 임상수련 모델인 과학자-전문가 모형은 Boulder 회의에서 채택되었다.
- ④ 1950년대 이후 항정신병 약물치료제 개발은 가정에 있던 많은 환자들을 정신병원으로 입원시키는 계기가 되었다.

## 79. 두뇌 기능의 국재화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① Lashley는 국재화 이론에 반론을 제기하였다.
- ② Broca 영역은 좌반구 측두엽 손상으로 수용적 언어결함과 관련된다.
- ③ Wernicke 영역은 좌반구 전두엽 손상으로 표현 언어결함과 관련된다.
- ④ MRI 및 CT가 개발되었으나 기능 문제 확인에는 외과적 검사가 이용된다.

## 80. 다음 중 심리학적 자문의 예로 틀린 것은?

- ① 만성질환자의 재활을 위한 프로그램
- ② 자살예방, 강간 및 폭력 후 위기개입
- ③ 약물치료의 정신적 부작용에 대한 정보
- ④ 청소년 성행동과 아동기 비만의 문제

## 5과목 : 심리상담

## 81. Bordin이 제시한 작업동맹(working alliance)의 3가지 측면을 바르게 짹지는 것은?

- ① 작업의 동의, 진솔한 관계, 든든한 유대관계
- ② 진솔한 관계, 든든한 유대관계, 서로의 호감
- ③ 유대, 작업의 동의, 목표에 동의
- ④ 서로의 호감도, 동맹, 작업의 동의

## 82. Glasser의 현실요법상담이론에서 가정하는 기본적인 욕구에 해당하지 않는 것은?

- ① 생존의 욕구
- ② 권력에 대한 욕구
- ③ 자존감의 욕구
- ④ 재미에 대한 욕구

## 83. 도박중독의 심리·사회적 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도박 중독자들은 대체로 도박에만 집착할 뿐 다른 개인적인 문제를 가지지 않는다.
- ② 도박 중독자들은 직장에서 도박 자금을 마련하기 위해 남보다 더 열심히 노력한다.
- ③ 심리적 특징으로 단기적인 만족을 추구하기 보다는 장기적인 만족을 추구한다.
- ④ 도박행동에 문제가 있음을 받아들이지 않고 변명하고 논쟁하려 든다.

## 84. 정신분석적 상담에서 내적 위험으로부터 아이를 보호하고 안정시켜주는 어머니의 역할처럼, 내담자가 막연하게 느끼지만 스스로는 직면할 수 없는 불안과 두려움에 대해 상담자의 이해를 적절한 순간에 적합한 방법으로 전해주면서 내담자에게 의지가 되어주고 따뜻한 배려로 마음을 녹여주는 활동을 무엇이라고 하는가?

- ① 버텨주기(holding)
- ② 역전이(counter transference)
- ③ 현실검증(reality testing)
- ④ 해석(interpretation)

## 85. 성폭력 피해자 심리상담 초기단계의 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 치료관계 형성에 힘써야 한다.
- ② 상담자는 상담 내용의 주도권을 가져야 한다.
- ③ 성폭력 피해로 인한 합병증이 있는지 묻는다.
- ④ 성폭력 피해의 문제가 없다고 부정을 하면 일단 수용해 준다.

## 86. 다음 중 가장 높은 수준의 공감적 표현방법은?

- ① 내담자의 표현에 중점을 두어 질문한다.
- ② 내담자가 표현한 것에 정확한 의미와 정서를 추가한다.
- ③ 이해하기 위해 노력하고 내담자의 단어로 반응한다.
- ④ 내담자의 감정을 정확히 반영한다.

## 87. 다음 중 특성-요인 상담의 특징으로 틀린 것은?

- ① 상담자 중심의 상담방법이다.
- ② 사례연구를 상담의 중요한 자료로 삼는다.
- ③ 문제의 객관적 이해보다는 내담자에 대한 정서적 이해에 중점을 둔다.
- ④ 내담자에게 정보를 제공하고 학습기술과 사회적 적용 기술을 알려주는 것을 중요시한다.

## 88. 자신조차 승인할 수 없는 욕구나 인격특성을 타인이나 사물로 전환시킴으로써 자신의 바람직하지 않은 욕구를 무의식적으로 감추려는 방어기제는?

- ① 동일화
- ② 합리화
- ③ 투사
- ④ 승화

## 89. 사회공포증 치료에서 극복을 위한 집단치료 프로그램 내용 중 불안을 유발하기 때문에 지금까지 피해왔던 상황을 더 이상 회피하지 않고 그 상황에 직면하게 하는 일종의 행동

## 치료기법은?

- ① 노출훈련
- ② 역할연기
- ③ 자동적 사고의 인지재구성 훈련
- ④ 역기능적 신념에 대한 인지재구성 훈련

## 90. 다음 중 학습상담의 과정으로 볼 수 없는 것은?

- ① 현실성 있는 상담목표를 설정해서 상담한다.
- ② 학습문제와 관련된 내담자의 감정을 이해하고 격려한다.
- ③ 내담자의 장점, 자원 등을 학습상담 과정에 적절히 활용 한다.
- ④ 학습문제와 무관한 개인의 심리적 문제는 회피한다.

## 91. 다음 중 자조집단과 치료집단에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생활상의 여러 문제들을 다루기에는 치료집단이 더 적절하다.
- ② 자조집단에서는 변화를 위한 촉진보다는 수용적이고 지지적인 분위기를 제공하는데 관심이 있다.
- ③ 치료집단의 리더로는 집단성원과 동일한 문제로 분투한 사람이 좋다.
- ④ 정신건강과 관련된 심각한 문제는 자조집단이 더 적절하다.

## 92. 다음 중 실존주의 상담접근에서 제시한 인간의 기본조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 인간은 누구나 자기인식 능력을 가지고 있다.
- ② 자신의 정체감 확립과 타인과 의미 있는 관계를 수립한다.
- ③ 인간은 완성을 추구하는 경향이 있다.
- ④ 죽음이나 비존재에 대해 인식한다.

## 93. 다음 중 알콜중독자 상담에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가족을 포함하여 타인의 방해를 받지 않기 위하여 비밀리에 상담한다.
- ② 치료 초기 단계에서 술과 관련된 치료적 계약을 분명히 한다.
- ③ 문제 행동에 대한 행동치료를 병행할 수 있다.
- ④ 치료후기에는 재발가능성을 언급한다.

## 94. 인간중심 상담기법에서는 내담자의 심리적 부적응, 부조화된 행동 그리고 이해할 수 없는 행동의 가장 중요한 원인이 어디에서 비롯되는 것으로 보는가?

- ① 무의식적 갈등      ② 자각의 부재
- ③ 현실의 왜곡과 부정      ④ 자기와 경험 간의 불일치

## 95. 다음 중 가족치료의 주된 목표와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가계의 특징을 파악하고 이를 재구조화 한다.
- ② 가족들 간의 잘못된 관계를 바로 잡는다.
- ③ 특정 가족원의 문제행동을 수정한다.
- ④ 가족원들 간의 의사소통 유형을 파악하고 의사소통이 잘 되도록 한다.

## 96. 사회학습이론의 관점에서 내담자가 직업선택을 효율적으로 할 수 있도록 돕기 위해 상담자가 해야 할 일은?

- ① 직업에서 요구하는 직무내용은 항상 변화할 수 있음을 예측하고 대비한다.

- ② 내담자가 행동하도록 격려하는 것은 진로 상담자의 업무 범위가 아님을 인식한다.
- ③ 내담자가 현재의 특성을 벗어나는 직업을 선택하지 않도록 한다.
- ④ 내담자가 제기한 문제 이외의 또 다른 의문을 제기하지 않는다.

## 97. 자살방지센터에서 긴급한 자살 상황에 처한 사람으로부터 걸려온 전화를 받는 자원봉사자의 가장 효과적인 행동요령은?

- ① 점검표(check list)를 앞에 놓고, 전화를 건 사람에게 자세한 질문을 던진다.
- ② 자살동기를 묻지 않는다.
- ③ 자살계획을 털어놓을 때까지 기다려야 한다.
- ④ 자살하지 말라고 지시한다.

## 98. 집단상담자는 집단원이 비생산적 행위를 할 때 이러한 행위를 저지 또는 제한할 수 있다. 집단성원의 비생산적 행위에 해당하지 않는 것은?

- ① 여러 명이 한 명에게 계속 감정을 표출한다.
- ② 특정 집단성원에게 개인적 정보를 캐묻는다.
- ③ 자기-드러내기를 시도한다.
- ④ 사회 현상에 대한 자신의 의견을 늘어놓는다.

## 99. 우울한 사람들이 보이는 체계적인 사고의 오류 중 결론을 지지하는 증거가 없거나 증거가 결론과 배치되는데도 불구하고 어떤 결론을 이끌어내는 과정을 의미하는 인지적 오류는?

- ① 선택적 추상화(selective abstraction)
- ② 과일반화(overgeneralization)
- ③ 개인화(personalization)
- ④ 임의적 추론(arbitrary inference)

## 100. 행동주의 집단상담의 절차를 바르게 나열한 것은?

- |                       |
|-----------------------|
| A 문제에 적합한 상담목표를 구체화   |
| B. 결과를 객관적으로 평가하고 피드백 |
| C. 문제가 되는 행동의 정의 및 평가 |
| D. 상담계획을 공식화하고 방법을 적용 |

- ① A → B → C → D    ② B → C → A → D
- ③ C → A → D → B    ④ D → A → C → B

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(4)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(3)	(2)	(4)	(4)	(4)	(3)	(1)	(2)	(2)	(3)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(3)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(1)	(3)	(2)	(2)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(1)	(4)	(3)	(2)	(4)	(2)	(2)	(4)	(4)	(2)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	(3)	(2)	(4)	(1)	(3)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(3)	(4)	(3)	(4)	(2)	(1)	(1)	(4)	(1)	(2)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(3)	(2)	(2)	(2)	(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(1)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(3)	(4)	(3)	(2)	(4)	(4)	(2)	(4)	(1)	(3)
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
(3)	(3)	(4)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
(2)	(3)	(1)	(4)	(3)	(1)	(1)	(3)	(4)	(3)