

1과목 : 심리학개론

1. '대학생들은 축구와 야구 중에 어느 것을 더 좋아하는가' 라는 문제를 검증하는 경우처럼 빈도나 비율의 차이검증에 가장 적합한 분석방법은?  
 ① t 검증                      ② F 검증  
 ③ Z 검증                      ④  $\chi^2$  검증
2. 어떤 행동을 형성하고 유지시키기 위한 강화계획에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 고정비율 계획에서는 매 n번의 반응마다 강화인이 주어진다.  
 ② 변동비율 계획에서는 평균적으로 n번의 반응마다 강화인이 주어진다.  
 ③ 고정간격 계획에서는 정해진 시간이 지난 후의 첫 번째 반응에 강화인이 주어지고, 강화인이 주어진 시점에서 다시 일정한 시간이 지난 후의 첫 번째 반응에 강화인이 주어진다.  
 ④ 변동비율과 변동간격 계획에서는 강화를 받은 후 일시적으로 반응이 중단되는 특성이 있다.
3. 주어진 자극과 장기기억 속에 저장되어 있는 과거의 경험 및 지식을 근거로 하여 주어진 자극이 무엇인지를 파악하는 과정은?  
 ① 선택적 주의                  ② 형태재인  
 ③ 부호화                      ④ 추론
4. Erikson의 심리사회적 단계에서 초기 성인기에 겪는 위기는?  
 ① 신뢰감 대 불신감          ② 정체감 대 혼미감  
 ③ 친밀감 대 고립감          ④ 생산성 대 침체감
5. Freud의 심리성적발달단계에서 초자아가 형성되는 시기는?  
 ① 구강기                      ② 항문기  
 ③ 남근기                      ④ 잠복기
6. 다음의 강화계획 중 학습된 행동이 쉽게 소거되지 않는 것은?  
 ① 고정간격강화                  ② 변동간격강화  
 ③ 고정비율강화                  ④ 변동비율강화
7. A타입 성격의 특성이 아닌 것은?  
 ① 강한 경쟁심                  ② 약속 불이행  
 ③ 강한 적대감                  ④ 쉽게 긴장
8. 고전적 조건형성에서 조건자극과 무조건자극을 배열할 때 조건형성효과가 가장 오래 지속되는 배열은?  
 ① 후진 배열                      ② 혼적 배열  
 ③ 지연 배열                      ④ 동시적 배열
9. 아동기의 애착에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 유아가 엄마에게 분명한 애착을 보이는 시기는 생후 3~4개월경부터이다.  
 ② 엄마와의 밀접한 신체접촉이 애착을 형성하는데 가장 중요한 역할을 한다.  
 ③ 애착은 인간 고유의 현상으로서 동물들에게는 유사한 현상을 찾아보기 어렵다.  
 ④ 안정적으로 애착된 아동들은 엄마가 없는 낯선 상황에서

도 주의를 적극적으로 탐색한다.

10. Alder의 개인심리학에서 무의식이나 성적 욕구보다 중요하게 다룬 개념은?  
 ① 열등감의 극복                  ② 자존감  
 ③ 자아                          ④ 성장
11. 살인 사건이나 화재 등으로 죽는 사람과 심장 마비로 죽는 사람 중 누가 더 많은 지를 묻는 질문에서 사람들이 흔히 범하는 확률추론과정의 오류는?  
 ① 가용성 발견법                  ② 대표성 발견법  
 ③ 확증 편향                      ④ 연역적 추리
12. 심리학에서 실험에 관한 일반적인 설명과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 실험참가자의 반응을 종속변인이라고 한다.  
 ② 흔히 실험자의 조작이 가해지지 않은 집단을 통제집단이라고 한다.  
 ③ 일반적으로 독립변인은 원인으로, 종속변인은 그 결과로 생각할 수 있다.  
 ④ 독립변인은 주로 실험자의 실험의도와는 상관없이 실험참가자가 실험에 임하기 전의 자연적 상태를 측정하는 변인이다.
13. 영아들을 대상으로 한 시각절벽(visual cliff) 실험을 통해 알 수 있는 것은?  
 ① 신생아들은 새로운 자극을 제시하면 맥박이 평상시보다 빨라진다.  
 ② 생후 6개월 이하의 영아들은 깊이지각 능력을 가지고 있다.  
 ③ 신생아들은 정지해있는 물건보다 움직이는 물건을 더 선호한다.  
 ④ 신생아들은 일반적인 도형보다 사람얼굴을 더 선호한다.
14. 다음 학습방법이 해당하는 것은?

실험자는 쥐로 하여금 지렛대를 누르는 반응을 하도록 만들기 위해, 첫 단계에서 쥐가 지렛대 근처에 오기만 해도 먹이를 준다. 다음 단계에서는 쥐가 지렛대를 건드리는 행동까지 했을 때 먹이를 준다. 셋째 단계에서는 쥐가 지렛대를 누르는 올바른 반응을 했을 때만 먹이를 준다.

- ① 조형                          ② 자극일반화  
 ③ 혐오적 조건형성                  ④ 체제적 둔감화
15. 상관계수에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 두 변수 사이의 관계를 기술하기 위한 것으로 두 변수가 연합되는 정도의 통계측정치이다.  
 ② 상관계수의 범위는 +1.0에서 -1.0까지이다.  
 ③ 두 변수 사이의 관계의 강도는 상관계수(r)의 절대치에 의해 규정된다.  
 ④ 한 변수가 다른 변수에 영향을 미치는 인과관계를 추론할 수 있다.
16. 기억정보가 아날로그 방식으로 표상됨을 나타내는 예는?  
 ① 심적 회전                      ② 마디(node)와 연결로(link)  
 ③ 디지털 컴퓨터                  ④ 명제

17. Atkinson과 Shiffrin의 기억모형에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 계열위치효과는 이 모형으로 잘 설명된다.  
 ② 단기기억에는 시연, 부호화, 결정, 인출전략의 4가지 통제과정이 있다.  
 ③ Miller가 주장한 단기기억 용량  $7 \pm 2$  청크도 이 모형과 잘 부합된다.  
 ④ 감각기관들은 직렬적으로 기능하기 때문에 정보처리에 유리하다.
18. 어떤 사람의 행동을 보고 상황이나 외적 요인보다는 사람의 기질이나 내적 요인에 그 원인을 두려고 하는 것은?  
 ① 고정관념                      ② 현실적 왜곡  
 ③ 후광효과                      ④ 기본적 귀인오류
19. 다음과 같은 입장을 취하고 있는 성격이론은?

자신을 형편없는 학생으로 지각하는 학생이 매우 좋은 성적을 받을 경우, 이 학생은 긍정적인 경험을 부정적인 자기개념과 일치시키기 위해 '운이 좋았어'라는 식으로 왜곡할 수 있다. 이 학생은 자기개념과 경험이 일치하지 않을 때 불안과 내적 혼란을 경험할 가능성이 높기 때문에, 자기개념을 유지하기 위해 경험을 부정하는 방어적 반응을 보인다. 이 학생이 경험을 부정하거나 왜곡하지 않도록 하기 위해서는 타인이 미학생을 무조건적이고 긍정적으로 존중해주고 공감해 주어야 한다.

- ① 특질이론                      ② 정신역동이론  
 ③ 현상학적 이론                      ④ 사회인지이론
20. Freud의 정신 역동적 접근에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 원초아는 현실의 원리를 따른다.  
 ② 사람들은 불안을 극복하기 위해 억압과 같은 방어기제를 사용한다.  
 ③ 아동이 강박적으로 청결이나 정돈에 매달리는 것은 항문기적 성격의 갈등 때문이다.  
 ④ 외디프스 콤플렉스는 남근기에 나타나는 현상이다.

## 2과목 : 이상심리학

21. 다음 밑줄친 '표현된 정서'의 의미로 옳은 것은?

가족들의 표현된 정서(expressed emotion)에 대한 연구에 의하면 가족들의 표현된 정서가 조현병의 재발률을 높인다고 한다.

- ① 지나치게 정서적 지지와 격려를 제공하는 것  
 ② 비판적으로 과도한 간섭을 하는 것  
 ③ 냉정하고, 조용하며, 무관심한 것  
 ④ 관여하지 않으며, 적절한 한계를 정해주지 못하는 것
22. DSM-5의 진단범주 중 영아기, 아동기 및 청소년기에 흔히 처음으로 진단되는 장애에 포함되지 않는 것은?  
 ① 지적발달장애                      ② 품행장애

- ③ 틱장애                      ④ 적응장애

23. 조현병의 다른 증상들은 없으면서 비현실적인 믿음을 유지하는 장애는?  
 ① schizoaffective disorder  
 ② schizophreniform disorder  
 ③ delusional disorder  
 ④ schizotypal personality disorder
24. 아동기에 나타날 수 있는 불안장애가 아닌 것은?  
 ① 선택적 무언증                      ② 사회불안장애  
 ③ 특정공포증                      ④ 자폐증
25. 외상적 사건에 대한 기억과 연관된 불안을 감소시키는데 초점을 맞추고 있으며, Foa에 의해 개발된 이후 외상후 스트레스 장애에 대해 경험적으로 지지된 치료로서 학계로부터 널리 인정을 받고 있는 치료법은?  
 ① 불안조절훈련                      ② 안구운동 둔감화와 재처리 치료  
 ③ 지속노출치료                      ④ 인지적 처리치료
26. 자살에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 모든 자살은 우울한 사람에게 국한되어 나타난다.  
 ② 자살 기도자는 여성이 많으나 자살 성공자는 남성이 많다.  
 ③ 자살률은 경제적 불황기에는 올라가며, 경제적 번영기에는 안정되어 있으며, 전쟁 중에는 감소 한다.  
 ④ 미국에서 아동 및 청소년기의 자살률은 증가하는 추세이다.
27. 신경성 식욕부진증에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 폭식하거나 하제를 사용하는 경우는 해당하지 않는다.  
 ② 체중과 체형이 자기평가에 지나치게 영향을 미친다.  
 ③ 말랐는데도 체중의 증가와 비만에 대한 극심한 두려움이 있다.  
 ④ 나이와 신장을 고려한 정상체중의 85% 이하로 체중을 유지한다.
28. 염색체 이상과 관련이 있는 장애로 신체적으로 특징적인 외모를 가진 장애는?  
 ① 다운증후군                      ② 아스퍼거 증후군  
 ③ 운동조정장애                      ④ 주의력결핍-과잉행동장애
29. 알코올 중독과 관련 있는 장애는?  
 ① 헌팅턴 무도병                      ② 코르사코프 증후군  
 ③ 레트 장애                      ④ 캐너 증후군
30. DSM-5에서 성도착 장애의 유형에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 노출장애 - 다른 사람이 옷을 벗고 있는 모습을 몰래 훑쳐보으로써 성적 흥분을 느끼는 경우  
 ② 관음장애 - 동의하지 않는 사람에게 자신의 성기나 신체 일부를 반복적으로 나타내는 경우  
 ③ 아동성애장애 - 사춘기 이전의 소아를 대상으로 하여 성적 공상이나 성행위를 반복적으로 나타내는 경우  
 ④ 성적 가학장애 - 굴욕을 당하거나 매질을 당하거나 묶이는 등 고통을 당하는 행위를 중심으로 성적 흥분을 느끼거나 성행위를 반복

31. 성격장애는 크게 세 집단으로 구분한다. 그 중 B군 성격장애 집단은 극적이고 감정적이며, 변덕스러운 특징을 보이는 성격장애 집단이다. 여기에 속하는 성격장애는?

- ① 편집성 성격장애      ② 경계성 성격장애  
③ 회피성 성격장애      ④ 의존성 성격장애

32. 다음 사례에서 김씨의 이러한 성격과 관련된 요인으로 확인할 사항이 아닌 것은?

고졸인 30대의 김씨는 사기 혐의로 교도소에 여러 번 다녀왔으나 부끄러운 줄 모르고 죄책감도 없다. 초등학교 때 남의 집에 불을 지르기도 했고 무단결석을 자주 했었다. 겉으로는 멀쩡하고 정신병적인 행동도 없다.

- ① 소아기에 신경학적 증후없이 중추신경계에 기능장애만 발생하였는지 여부  
② 테스토스테론 호르몬의 수치가 정상 수준인지 여부  
③ 부모의 성격이 파괴적이거나 변덕스럽고 충동적이어서 노골적인 증오심과 거부로 시달려 일관성 있는 초자아 발달에 지장이 있었는지 여부  
④ 부모의 질병, 별거, 이혼 또는 거부감정이 있어서 기본적으로 요구되는 사랑, 안전, 안정 및 존경심에 문제가 있는지 여부

33. DSM-5에서 '신체증상 및 관련 장애' 분류항목에 해당하는 것은?

- ① 전환장애(conversion disorder)  
② 다중인격(multiple personality)  
③ 심인성 건망증(psychogenic amnesia)  
④ 신체변형장애(body dysmorphic disorder)

34. 다음과 같은 과제수행에 필요한 여러 가지 인지기능을 수행하지 못하는 치매증상은?

과제수행에 필요한 여러 가지 인지기능, 즉 과제를 하위과제로 쪼개기, 순서별로 배열하기, 계획하기, 시작하기, 결과 점검하기, 중단하기 등의 기능

- ① 실어증      ② 실인증  
③ 지남력장애      ④ 실행기능장애

35. 공포증에 대한 2요인 이론은 어떤 요인들이 결합된 이론인가?

- ① 학습 요인과 정신분석 요인  
② 학습 요인과 인지 요인  
③ 회피 조건형성과 준비성 요인  
④ 고전적 조건형성과 조작적 조건형성

36. Abramson 등의 '우울증의 귀인이론 (attributional theory of depression)'에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 우울증에 취약한 사람은 실패경험에 대해 내부적, 안정적, 전반적 귀인을 하는 경향이 있다.  
② 실패경험에 대한 내부적 귀인은 자존감을 손상시킨다.  
③ 실패경험에 대한 안정적 귀인은 우울의 만성화에 기여한다.

④ 실패경험에 대한 특수적 귀인은 우울의 일반화를 조장한다.

37. Schneider가 주장한 조현병(정신분열병)의 일급증상이 아닌 것은?

- ① 사고 누락      ② 사고 반향  
③ 사고 투입      ④ 사고 전파

38. DSM-5에 따라 성격장애를 군집별로 분류할 때 옳은 것은?

- ① 이상하며 기괴한 증상을 보이는 성격장애 군집으로는 조현형, 조현성, 편집성 성격장애가 있다.  
② 극적이고 감정적이며 변덕스러운 것이 특징인 장애로 히스테리성, 자기애성, 반사회성, 회피성 성격장애가 있다.  
③ 가학적, 자기패배적, 수동공격적 성격장애는 DSM-5에서 중요하게 다루어지는 성격장애의 군집이다.  
④ 불안하고 두려움, 근심스러운 것이 특성인 성격장애로 편집성, 의존성, 경계성 성격장애가 있다.

39. 조현형 성격장애 진단기준에 포함되지 않는 것은?

- ① 괴이한 사고와 언어      ② 과도한 사회적 불안  
③ 관계망상적 사고      ④ 불안정하고 강렬한 대인관계

40. Bleuler가 제시한 조현병(정신분열병)의 네 가지 근본증상, 즉 4A에 해당하지 않는 것은?

- ① 감정의 둔마(affective blunting)      ② 자폐증(autism)  
③ 양가감정(ambivalence)      ④ 무논리증(alogia)

### 3과목 : 심리검사

41. K-WAIS-IV에서 개념형성능력을 측정하는 소검사는?

- ① 차례맞추기      ② 공통성문제  
③ 이해문제      ④ 빠진곳 찾기

42. K-WISC-IV의 시행 연령 범위는?

- ① 3~7세      ② 6~16세  
③ 5~10세      ④ 12~20세

43. 치매가 의심되는 노인 환자를 대상으로 실시할 검사와 관련이 없는 것은?

- ① MMPI-2      ② 간이정신상태검사(MMSE)  
③ 기억력검사      ④ 이름대기검사(BNT)

44. 신경심리검사와 가장 거리가 먼 것은?

- ① H-R(Halstead-Reitan Battery)  
② L-N(Luria-Nebraska Battery)  
③ BGT(Bender Gestalt Test)  
④ Rorschach Ink Blot test

45. 지능검사 결과를 해석할 때 주의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① IQ 점수를 표시된 숫자 그 자체로 생각할 것  
② 과잉해석을 피할 것  
③ 합리적이되 융통성을 가질 것  
④ 학교성적을 예측할 수 있는 여러 변인 중의 하나로 생각할 것

46. 성취도 검사와 적성검사의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 성취도 검사와 적성검사의 차이는 문항형식에 있다.
  - ② 성취도는 과거 중심적이고 적성은 미래 중심적이라고 할 수 있다.
  - ③ 성취는 유전의 영향을, 적성은 환경의 영향을 많이 받는 것으로 본다.
  - ④ 대부분의 학자들은 적성을 특수능력보다는 일반적 능력으로 본다.
47. 아동이 현재 보이고 있는 시각-운동 발달 수준이 아동의 실제 연령에 부합되는 것인지 알고 싶다면 BGT 검사 시 어떤 방법론적 고려를 하는 것이 가장 적합한가?
- ① Koppitz Developmental Bender Scoring System
  - ② Group Test
  - ③ Tachistoscopic Procedure
  - ④ Raven's Progressive Matrices
48. MMPI-2와 비교할 때 성격평가질문지(PAI)의 특징이 아닌 것은?
- ① 문항의 수가 더 적다.
  - ② 임상척도의 수가 더 적다.
  - ③ 임상척도 이외에 대인관계척도를 포함한다.
  - ④ 4지 선다형이다.
49. MMPI-2 검사를 실시할 때 유의사항으로 틀린 것은?
- ① 독해력이 초등학교 6학년수준 미만인 사람에게는 실시하기 어렵다.
  - ② 시행 소요시간이 90분 내외로 적정한지 검토해야 한다.
  - ③ MMPI-2는 반드시 개별적으로 실시해야 한다.
  - ④ 피검사자에게 “현재의 상태”를 기준으로 평가하라고 지시한다.
50. 심리평가 면담에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 수검자뿐 아니라 필요하다면 보호자와 같은 주변 사람으로부터 정보를 얻을 수 있다.
  - ② 라포를 유지한 상태에서 수검자의 자발성을 최대한 이끌어내는 것이 필요하다.
  - ③ 수검자의 진술에서 객관적 현실에 부합되지 않는 경우는 직면이 필요하다.
  - ④ 폐쇄형 질문보다는 개방형 질문을 우선적으로 사용한다.
51. MMPI-2에서 5번 척도가 높은 여대생의 경우에 가능한 해석으로 가장 적합한 것은?
- ① 성격적으로 수동-공격적인 특성이 있다.
  - ② 반드시 남성적인 흥미를 나타내는 것은 아니다.
  - ③ 자신감이 부족하고 충동적이다.
  - ④ 심미적이고 예술적인 취미를 가지며 지능이 우수하다.
52. 투사적 성격검사와 비교할 때, 객관적 성격검사의 장점은?
- ① 객관성의 증대                      ② 반응의 다양성
  - ③ 방어의 곤란                        ④ 무의식적 내용의 반응
53. 심리평가 면담의 지침으로 옳은 것은?
- ① 면담 초기 정보획득을 위해 구체적인 사안을 다루는 폐

- 쇄형 질문으로 시작한다.
- ② 수검자에게 검사에 대한 설명을 하고 평가에 대한 동의를 얻는다.
  - ③ 심리검사를 받는 이유와 증상에 대한 질문은 면담의 뒷부분에 한다.
  - ④ 다른 정보 출처 보다는 내담자 본인에게 얻은 정보를 최우선으로 한다.
54. 동일한 검사를 동일한 집단에 1주일 또는 1개월의 간격을 두고 다시 실시하여 전후 검사 결과를 상관계수로 계산하는 신뢰도는?
- ① 동형검사 신뢰도                      ② 검사-재검사 신뢰도
  - ③ 반분 신뢰도                        ④ 문항내적 합치도
55. Rosenzweig의 그림좌절검사(Picture Frustration Test)에서는 표출되는 공격성의 세 방향을 구분하고 있다. 세 방향에 속하지 않는 것은?
- ① 투사지향형                              ② 내부지향형
  - ③ 외부지향형                              ④ 회피지향형
56. MMPI-2에서 4-6척도가 상승한 사람의 특징일 가능성이 가장 적은 것은?
- ① 항상 긴장되어 있고 다양한 신체적 증상을 나타낼 가능성이 높다.
  - ② 분노와 적개심이 억제되어 있을 가능성이 높다.
  - ③ 타인에 대한 불신감이 많을 가능성이 높다.
  - ④ 권위적 대상(authority figure)과의 관계에서 문제가 발생할 가능성이 높다.
57. BGT에 의해 아동의 정서적 문제를 알아보고자할 때, 고려해야 할 지표와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 도형의 각도 변화                      ② 도형 크기의 변화 여부
  - ③ 도형 배치의 순서                      ④ 선긋기의 강도
58. Cattell의 지능이론에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① Cattell은 지능을 유동적 지능과 결정적 지능으로 구별하였다.
  - ② 유동적 지능은 22세 이후 까지도 지속적으로 발달한다.
  - ③ 결정적 지능은 문화적, 교육적 경험에 따라 영향을 받는다.
  - ④ 유동적 지능은 개인의 독특한 신체구조와 과정에 기초한 선천적 기능이다.
59. 교통사고 환자의 신경심리 검사에서 궤병을 의심할 수 있는 경우는?
- ① 기억과제에서 쉬운 과제에 비해 어려운 과제에서 더 나은 수행을 보일 때
  - ② 즉각 기억과제와 지연기억과제의 수행에서 모두 저하를 보일 때
  - ③ 뚜렷한 병변이 드러나며 작의적인 반응을 보일 때
  - ④ 단기기억 점수는 정상범위이나 다른 기억점수가 저하를 보일 때
60. 아동의 발달적 수준을 측정하기 위해 사용하기 어려운 검사는?
- ① 사회성숙도 검사(SMS)                      ② 인물화 검사(DAP)
  - ③ 아동용 주테통각검사(CAT)                      ④ 벤더도형검사(BGT)

4과목 : 임상심리학

61. 전통적인 정신역동적 심리평가와 비교한 행동평가의 특징으로 옳은 것은?
- ① 행동의 무의식적인 동기를 파악할 수 있다.
  - ② 문제행동의 주요 원인을 내적인 심리과정에서 찾는다.
  - ③ 가설적-연역법을 적용하여 환경요인을 규명한다.
  - ④ 특정 정신장애의 진단을 목표로 하는 경우가 많다.
62. 대뇌피질 각 영역의 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 측두엽 : 망막에서 들어오는 시각정보를 받아 분석하며 이 영역이 손상되면 안구가 정상적인 기능을 하더라도 시력을 상실하게 된다.
  - ② 후두엽 : 언어를 인식하는 데 중추적인 역할을 하며 정서적 경험이나 기억에 중요한 역할을 담당한다.
  - ③ 전두엽 : 현재의 상황을 판단하고 상황에 적절하게 행동을 계획하며 부적절한 행동을 억제하는 등 전반적으로 행동을 관리하는 역할을 한다.
  - ④ 두정엽 : 대뇌피질의 다른 영역으로부터 모든 감각과 운동에 관한 정보를 다 받으며 이러한 정보들을 종합한다.
63. 다음 중 기준(norm)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 측정된 점수의 일관성 정도를 제공해준다.
  - ② 검사 실시와 과정이 규정된 절차에서 이탈된 정도를 제공해준다.
  - ③ 특정집단의 전형적인 또는 평균적인 수행 지표를 제공해준다.
  - ④ 연구자가 측정한 의도에 따라 측정이 되었는지의 정도를 제공해준다.
64. 사회기술 훈련 프로그램의 구성요소에 해당되지 않는 것은?
- ① 문제해결 기술
  - ② 의사소통 기술
  - ③ 증상관리 교육
  - ④ 자기주장 훈련
65. 임상적 면접에서 사용되는 바람직한 의사소통 기술에 해당되는 것은?
- ① 면접자 자신의 사적인 이야기를 꺼내는데 주저하지 않는다.
  - ② 침묵이 길어지지 않게 하기 위해, 면접자는 즉각 개입할 준비를 한다.
  - ③ 폐쇄형보다는 개방형 질문을 주로 사용한다.
  - ④ 내담자의 감정보다는 얻고자 하는 정보에 주목한다.
66. 브로카(Broca) 영역 및 그 안쪽에 있는 백질과 주변 영역이 손상되었을 때 나타나는 증상은?
- ① 언어적 표현의 장애 혹은 표현적 실어증
  - ② 언어적 이해의 장애 혹은 수용적 실어증
  - ③ 목표지향적 운동을 수행하지 못하는 실행증
  - ④ 소리가 인식되거나 해석되지 못하는 실인증
67. 학생 상담 시 어떤 학생이 또래들에게 가장 선호되고, 혹은 그렇지 못하는가를 확인해 보기 위해 사회관계 측정법(sociogram)을 사용하려고 한다. 상담자가 사회관계 측정법을 사용 시 유의사항으로 틀린 것은?
- ① 유의미한 결과를 얻어내려면 학생들간에 교류하는 시간이 충분해야 한다.
  - ② 학생의 연령대가 어릴수록 반응이 솔직하고 신뢰도와 타

당도가 높다.

- ③ 집단의 크기가 유용한 정보를 제공해 줄 수 있으므로 집단의 크기가 너무 크거나 너무 작아도 안된다.
  - ④ 유의미한 집단활동이 있어야 학생들간의 교류가 일어나므로, 상담자는 학생들에게 의미있고 친숙한 활동을 선택해서 제공해야 한다.
68. 비밀보장에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 내담자에게 얻은 정보에 대한 비밀보장을 중요시해야 한다.
  - ② 내담자 자신이나 타인에게 명백한 위험을 초래하게 되는 경우에도 비밀보장은 준수되어야 한다.
  - ③ 적절한 시기에 내담자들에게 비밀보장의 법적인 한계에 대하여 알려주어야 한다.
  - ④ 전문적인 관계에서 얻은 정보나 평가자료는 전문적인 목적을 위해서만 토론되어야 한다.
69. 건강심리학 분야의 주된 관심 영역과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 흡연
  - ② 우울증
  - ③ 비만
  - ④ 알코올 남용

70. 다음은 어떤 치료에 관한 설명인가?

경계성 성격장애와 감정조절의 어려움과 충동성이 문제가 되는 상태를 치료하기 위해 상대적으로 최근에 개발된 인지행동치료이다. Linehan은 자살 행동을 보이는 여자 환자들의 임상 경험을 바탕으로 이 치료를 개발하였다.

- ① 현실치료
  - ② 변증법적 행동치료
  - ③ 의미치료
  - ④ 게슈탈트치료
71. 정신질환자의 사회복귀정책에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?
- ① 유럽과 미국에서 시작되었으며, 전세계적으로 확산되는 추세이다.
  - ② 기관에 수용하는 정책보다 국가예산이 더 많이 소요된다.
  - ③ 인본주의적 정신에 기초하여, 환자의 삶의 질을 높이는 데 주력한다.
  - ④ 의학적 모형에 토대한 병원 중심의 재활이 아니고, 사회심리학적 모형에 토대한 지역사회 중심의 재활이 더 중요하다.
72. 다음 중 관계를 중심으로 치료가 초점화되고 있는 정신역동적 접근방법의 단기치료가 아닌 것은?
- ① 핵심적 갈등관계 주제(core conflictual relationship theme)
  - ② 불안유발 단기치료(anxiety provoking brief therapy)
  - ③ 기능적 분석(functional analysis)
  - ④ 분리개별화(separation and individuation)
73. 다음 ( )에 가장 알맞은 용어는?

기말 고사에서 전 과목 100점을 받은 경희는 최우수상을 받고 친구들 앞에서 선생님께 칭찬도 받았다. 선생님은 ( ) 학습과정을 사용하고 있다.

- ① 조건화                      ② 내적 동기화
- ③ 성취                        ④ 모델링

74. 체계적 둔감법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기본 절차는 조작적 조건형성의 원리에 기초한 치료기법이다.
- ② 주로 불안과 관련된 부적응 행동의 치료에 사용된다.
- ③ 불안을 일으키는 자극들을 반복적으로 이완상태와 짝 지운다.
- ④ 신경성 식욕부진증, 충동적 행동, 우울증을 치료하는데도 사용된다.

75. K-WAIS-IV의 하위검사 중 주어진 시각적 자극의 전체를 고려하여 답을 끌어내는 능력을 측정하며, 시각적 추론의 적절성을 평가하는 검사는?

- ① 기호쓰기                      ② 동형찾기
- ③ 토막짜기                      ④ 행렬추리

76. 미국 사회에서 1950년대 많은 정신과 환자들이 병원장면을 떠나 지역사회 정신건강 기관이나 사회에 복귀하게 한 직접적인 원인은?

- ① 항정신성 약물치료      ② 행동주의 접근 치료
- ③ 인본주의 접근 치료      ④ 정신분석적 접근 치료

77. 행동치료를 위해 현재문제에 대한 기능분석을 하면 규명할 수 있는 요소가 아닌 것은?

- ① 문제행동을 일으키는 자극이나 선행조건
- ② 문제행동과 관련있는 유기체 변인
- ③ 문제행동과 관련된 인지적 해석
- ④ 문제행동의 결과

78. 다음 중 Rogers는 어떤 치료 기법을 발전시켰는가?

- ① 내담자 중심                      ② 합리-정서치료
- ③ 인지 행동치료                      ④ 대상관계치료

79. 정신건강의학과 병동에 입원한 환자들 중 단체생활의 규칙을 잘 지키지 않는 환자들의 행동문제들을 개선하는데 가장 효과적인 치료적 접근은?

- ① 정신분석                      ② 체계적 둔감법
- ③ 토큰 경제                      ④ 현실치료

80. 구조적 가족치료를 창안한 사람은?

- ① Adler                              ② Sullivan
- ③ Minuchin                              ④ Hartman

### 5과목 : 심리상담

81. 청소년의 게임중독 치료와 관련하여 가장 적합하지 않은 개입은?

- ① PC방에 다녀온 것을 기록하게 한다.
- ② 상담의 목표를 부모님과 의논한 후 상담자가 정해준다.
- ③ 상담과정에 어머니를 조력자로 적극적으로 개입시킨다.
- ④ 자기관리 훈련을 시킨다.

82. Taylor가 제시한 학습부진아에 관한 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 학업에 대한 막연한 불안감을 가지고 있다.
- ② 자기비판적이고 부적절감을 가져 자존감이 낮다.
- ③ 목표설정이 비현실적이고 지속적인 실패를 보인다.
- ④ 주의가 산만하고 과업지향적이다.

83. Axline의 비지시적 놀이치료에서 놀이치료자가 갖추어야 할 원칙에 포함되지 않는 것은?

- ① 아동을 있는 그대로 수용한다.
- ② 아동과 따뜻하고 친근한 관계를 가능한 빨리 형성하도록 한다.
- ③ 가능한 비언어적인 방법으로만 아동의 행동을 지시한다.
- ④ 아동이 타인과의 관계형성이 본인의 책임이라는 것을 알도록 하기 위해서는 제한을 둘 수 있다.

84. 정신분석적 상담기법 중 상담진행을 방해하고 현재 상태를 유지하려는 의식적, 무의식적 생각, 태도, 감정, 행동을 의미하는 것은?

- ① 전이                              ② 저항
- ③ 해석                              ④ 훈습

85. 게슈탈트 심리치료에서 알아차림-접촉주기 단계의 진행순서로 옳은 것은?

- ① 배경 → 알아차림 → 감각 → 에너지 동원 → 행동 → 접촉 → 배경
- ② 배경 → 에너지 동원 → 감각 → 알아차림 → 접촉 → 행동 → 배경
- ③ 배경 → 감각 → 알아차림 → 에너지 동원 → 행동 → 접촉 → 배경
- ④ 배경 → 감각 → 알아차림 → 행동 → 에너지 동원 → 접촉 → 배경

86. 다음 중 상담목표의 구성요소에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과정목표는 내담자의 변화에 필요한 상담분위기의 조성과 관련된다.
- ② 과정목표에 대한 결과는 내담자의 책임이다.
- ③ 결과목표는 내담자가 상담을 통해 이루고자 하는 구체적인 삶의 변화와 관련된다.
- ④ 결과목표는 일반적으로 객관적일수록 효과적이다.

87. 약물에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 약물 내성은 동기의 대립과정이론으로 설명할 수 있다.
- ② 바비류레이트는 자극제이다.
- ③ 메스칼린은 환각제다.
- ④ 진정제는 GABA 시냅스에 영향을 준다.

88. 정신분석 상담에서 전이분석이 중요한 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 내담자에 대한 상담자의 감정이 나온다.
- ② 상담자의 감정을 드러내지 않게 해준다.
- ③ 무의식 내용을 알 수 있는 최선의 길이다.
- ④ 내담자에게 현재 관계에 대한 과거의 영향을 깨닫게 해준다.

89. 다음 중 전화상담에서 가장 중심이 되어야 하는 활동은?

- ① 위기상황에 대한 판단                      ② 신뢰관계의 구축
- ③ 감정의 이해                              ④ 통찰의 유발

90. 사이버상담의 발생과 미래에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 사이버상담은 전화상담처럼 자살을 비롯한 위기 상담이라는 뚜렷한 목적을 갖고 시작되었다.
  - ② 사이버상담자들의 전문성과 윤리성 등을 통제하고 관리하는 체제가 필요하다.
  - ③ 사이버상담의 전문화를 위해 기존 면대면상담과는 다른 새로운 상담기법을 개발하고 실험을 통해 효과를 검증할 필요가 있다.
  - ④ 사이버상담은 기존의 면대면상담과 전화상담에 참여하지 않았던 새로운 내담자군의 출현을 가져왔다.
91. 정신분석적 상담에서 내적 위험으로부터 아이를 보호하고 안정시켜주는 어머니의 역할처럼, 내담자가 막연하게 느끼지만 스스로는 직면할 수 없는 불안과 두려움에 대해 상담자의 이해를 적절한 순간에 적합한 방법으로 전해주면서 내담자에게 의지가 되어주고 따뜻한 배려로 마음을 녹여주는 활동을 무엇이라고 하는가?
- ① 버터주기(holding)
  - ② 역전이(counter transference)
  - ③ 현실검증(reality testing)
  - ④ 해석(interpretation)
92. 상담에서 나타날 수 있는 윤리적 갈등의 해결단계를 바르게 나열한 것은?
- ㄱ. 관련 윤리강령, 법, 규정 등을 살펴본다.  
 ㄴ. 한 사람 이상의 전문가에게 자문을 구한다.  
 ㄷ. 현 상황에서 문제점이나 딜레마를 확인한다.  
 ㄹ. 다양한 결정의 결과를 열거해보고 결정한다.
- ① ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ
  - ② ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
  - ③ ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㄹ
  - ④ ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ
93. 성피해자에 대한 심리치료 과정 중, 초기단계에서 상담자가 유의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 치료의 관계형성을 위해 수치스럽고 창피한 감정이 정상적인 감정임을 공감한다.
  - ② 피해상황에 대한 진술은 상담자 주도로 이루어져야 한다.
  - ③ 성피해 사실에 대한 내담자의 부정을 허락한다.
  - ④ 내담자에게 치료자에 대한 감정을 물어주고 치료자를 선택할 수 있도록 해준다.
94. 벌을 통한 행동수정 시 유의사항이 아닌 것은?
- ① 벌 받을 행동을 구체적으로 세분화하고 설명한다.
  - ② 벌을 받을 상황을 가능한 한 없애도록 노력한다.
  - ③ 벌은 그 강도를 점차로 높여가야 한다.
  - ④ 벌 받을 행동이 일어난 직후에 즉각적으로 벌을 준다.
95. REBT 상담자들이 탐색, 자유토의, 통렬한 비난, 해석 등 보통의 상담기법에 첨가하여 사용하는 기법이 아닌 것은?
- ① 구조화
  - ② 직면
  - ③ 교화
  - ④ 재교육
96. 검사결과 해석시 주의할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 검사해석의 첫 단계는 검사 매뉴얼을 알고 이해하는 것

- 이다.
- ② 내담자가 받은 검사의 목적과 제한점 및 장점을 검토해본다.
  - ③ 결과에 대한 구체적 예언보다는 오히려 가능성의 관점에서 제시되어야 한다.
  - ④ 검사결과로 나타난 장점이 주로 강조되어야 한다.
97. 직업상담원의 역할에 해당되지 않는 것은?
- ① 직업상담
  - ② 직업창출
  - ③ 직업정보분석
  - ④ 직업지도 프로그램 운영
98. Weiner의 비행분류에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 비행자의 심리적인 특징에 따라서 사회적 비행과 심리적 비행을 구분한다.
  - ② 심리적 비행에는 성격적 비행, 신경증적 비행, 정신병적(기질적) 비행이 속한다.
  - ③ 신경증적 비행은 행위자가 타인의 주목을 끌 수 있는 방식으로 비행을 저지르는 경우가 많다.
  - ④ 소속된 비행하위집단 내에서 통용되는 삶의 방식들은 자존감과 소속감을 가져다주므로 장기적으로 적응적이라고 할 수 있다.
99. 형태치료(게슈탈트 치료)에서 접촉-경계 혼란을 일으키는 여러 가지 심리적 현상 중 사람들이 감당하기 힘든 내적 갈등이나 환경적 자극에 노출될 때 이러한 경험으로부터 압도당하지 않기 위해 자신의 감각을 둔화시킴으로써 자신 및 환경과의 접촉을 악화시키는 것은?
- ① 내사(introjection)
  - ② 반전(retroflexion)
  - ③ 융합(confluence)
  - ④ 편향(deflection)
100. 다음 중 진로상담의 목표와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 직업 세계에 대한 이해
  - ② 의사결정 능력의 함양
  - ③ 상급학교 진학 동기의 고취
  - ④ 직업선택 및 직업생활에 대한 능동적인 태도 함양

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	③	③	④	②	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	④	①	④	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	④	③	①	①	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	④	④	④	①	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	④	①	②	①	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	②	①	①	①	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	③	③	①	②	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	①	④	①	③	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	③	②	③	②	②	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	③	①	④	②	④	④	③