1과목 : 종자생산학 및 종자법규

- 1. 경실 종자의 발아촉진법으로 가장 효과가 옳은 것은?
 - 1 질산염처리
- ② 방사선처리
- ③ 에스렐처리
- ④ 사이토카이닌처리
- 2. 벼 종자를 수입하려 할 때 누구에게 수입신고서를 제출하여 야 하는가?
 - ① 농림부장관
 - 2 종자관리소장
 - ③ 시.도지사
 - ④ 국립농산물품질관리원장
- 원원종 채종 재배시 이품종으로부터 포장 격리거리가 가장 먼 품종은?
 - ① 坩

2 참깨

③ 옥수수

④ 팥

- 4. 종자산업법상 품종의 보호를 받을 수 있는 종자가 갖추어야 할 요건이 아닌 것은?
 - ① 구별성

② 균일성

응성

- ④ 안정성
- 5. 항온건조기법에 의하여 보리종자의 수분함량을 측정하였다. 수분측정관과 덮개의 무게가 10g, 건조 전총무게가 15g, 건 조 후 총무게가 14g일 때, 종자수분함량(%)은?
 - 10.0%

2 15.0%

3 20.0%

- 4 25.0%
- 6. 벼의 도복방지 대책으로 부적합한 것은?
 - ① 품종의 선택
- ② 재배조건의 개선
- **3** 다비재배
- ④ 병충해 방제
- 7. 종자산업법상 출원품종의 심사방법에 관한 설명 중 옳은 것 은?
 - ① 출원품종의 심사는 심사위원회에서 한다.
 - ② 심사는 서류심사에 의해 판단한다.
 - 3 출원품종의 요건에 대한 심사는 심사관이 한다.
 - ④ 심사를 위한 조사 또는 시험은 위탁해서는 안 된다.
- 8. 단위생식(Apomixis)에 의해서 생긴 종자 또는 식물은?
 - ① 종간잡종

② 일대잡종

위잡종

- ④ 중복잡종
- 9. 발아검사시 치상 재료를 모래나 훍 또는 물로 할 경우 적당 한 pH의 범위는?
 - ① 8.5 ~ 10.0

2 7.5 ~ 8.5

3 $6.0 \sim 7.5$

- 4 4.0 \sim 6.0
- 10. 종자산업법령상 농민이 자가생산을 목적으로 자가 채종하는 때에 품종보호권을 제한할 수 있는 범위는?
 - ① 10kg 이내의 최소 종자량으로 한다.
 - ② 20kg 이내의 종자량으로 제한한다.
 - ③ 30kg 이상의 종자량으로 한다.
 - 4 당해 농업인이 경작하고 있는 포장에 심을 수 있는 최대

종자량으로 한다.

- 11. 현재 우리나라에서 종자산업법규상 품종보호를 받을 수 있는 대상 작물의 속 또는 종의 총 개수는? (단, 기타 농림부 장관이 정하는 작물은 제외한다)
 - **1** 27

2 37

3 47

- 4 57
- 12. 다음 중 꽃가루가 암술머리에 떨어지는 현상은?
 - Pollination

② Fertilization

③ Cross

- 4 Hybridization
- 13. 무 채종시 채종 모본의 엄중 선발을 요할 경우 행하는 채종 양식은?

① 직파 채종

② 이식 채종

③ 춘파 채종

- ◑ 성숙모본 채종
- 14. 포장검사 및 종자검사의 검사기준 중 용어의 정의 로 옳은 것은?
 - ① 1차시료란 소집단의 한 부분으로부터 얻어진 적은 양의 시료를 말한다
 - ② 합성시료란 검사실에서 제출시료로부터 취한 분할 시료 로 품위검사에 제공되는 시료이다.
 - ③ 품종순도란 동일품종 내에서 유전적 형질이 그 품종고유의 특성을 갖지 아니한 개체를 말한다.
 - ④ 정립이란 이종종자, 잡초종자 및 이물을 포함한 종자를 말한다.
- 15. 다음 중 종자의 가공처리에 해당하는 것은?
 - ① 장일처리, 종자코팅처리
 - ② 종자코팅처리, 프라이밍처리
 - ③ 건열처리. 큐어링처리
 - ④ 큐어링처리, 장일처리
- 16. 발아중에 자엽이나 자엽처럼 양분을 저장하고 있는 기관이 지면 밖으로 나오는 작물은?

① 콩

② 坩

③ 옥수수

- ④ 완두
- 17. 종자산업법규상 무 종자의 보증 유효기간은?

① 6개월

② 1년

🚯 2년

- ④ 3년
- 18. 종자산업법령상 국유품종보호권의 처분을 수의계약의 방법 으로 할 수 없는 때는?
 - ① 국유품종보호권의 실시에 있어서 특정인의 기술이나 설 비가 필요하여 일반경쟁입찰에 부칠 수 없을 때
 - 2 1회에 낙찰되거나 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는
 - ③ 전용실시권의 설정을 받은 자에게 그 국유품종보호권을 양도하는 때
 - ④ 천재, 지변이나 전시, 사변 또는 이에 준하는 국가비상사 태의 경우로서 일반경쟁입찰에 부칠 시간적 여유가 없을
- 19. 종자가 모식물에서 떨어진 후 휴면하고 있는 종자 발아를 위해 종자 내부에서 성숙이 일어나는 현상?

- ① 성숙
- ② 후숙
- ③ 황숙
- ④ 미숙

20. 종자의 숙도에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 포장 병충해 유무
- ② 토양 비옥도와 시비량
- ③ 수확 전 토양의 관수 정도
- 1 개화수정 후 종자채취까지의 일수

2과목: 식물육종학

21. 현재 재배하고 있는 작물의 원산지를 파악하는데 필요한 학 설은?

- ① 이반 인자설
- ② 아포체 반응설
- ③ 신 키아스마설
- 4 유전자 중심지설

22. 꽃가루의 영향이 당대에 종자 이외의 부분인 과형, 과육, 과 즙 및 성숙기 등에 나타나는 현상은?

- ① 크세니아
- 2 메타크세니아
- ③ 위수정
- ④ 키메라현상

23. 다음 중 3원 교배에 해당하는 교배 조합은?

 $\mathbf{0}$ (A×B)×C

- \bigcirc (A×B)×A
- $(C \times A) \times (B \times C) \times (A \times B)$
- $(A \times B) \times B$

24. 아조변이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ❶ 환경에 의한 일시적 변이이다.
- ② 체세포적인 변이이다.
- ③ 과수류 육종에 적합하다.
- ④ 감귤류에 자연변이가 많다.

25. 다음 marker 중 PCR 기기를 이용하여 DNA를 증폭하는 원 리를 활용하지 않는 것은?

- ① PAPD
- 2 RFLP
- 3 AFLP
- 4 SSR

26. 도입품종에 대하여 도입 1년차에 실시할 검정대상이 되지 않는 것은?

- ① 적응성 검정시험
- ② 품종 비교시험
- 3 조합능력 검정시험
- ④ 생산력 검정시험

27. 많은 유전자형의 집단 속에서 모주의 생산력을 중심으로 선 발하여 방임수분에 의해 채종하는 방법은?

- ❶ 모계선발법
- ② 집단선발법
- ③ 계통집단선발법
- ④ 순계분리법

28. Bulk method(혼합육종법)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선발개체의 후대에서 분리가 일어나는 경우가 매우 적다.
- ② 자식성작물은 $F6 \sim F7$ 에 가서 거의 80%이상의 개체가 고정된다.
- 에대단축은 불가능하지만 우량한 질적형질을 선발할 수 있다.
- ④ 잡종강세 개체를 잘못 선발할 위험도가 적다.

29. 감수분열(생식세포분열)의 특징을 옳게 설명한 것은?

- ① 하나의 화분모세포는 연속적으로 분열하여 많은 수의 소 포자를 형성한다.
- ② 하나의 배낭모세포는 1회 분열하여 2개의 배낭을 형성한 다
- 하나의 화문모세포는 2회 분열하여 4개의 화분립을 형성 한다.
- ④ 하나의 배낭모세포는 3회 연속분열하여 8개의 암배우자 를 형성한다.

30. 자식성 작물에서 가장 널리 쓰이는 분리육종법은?

- ❶ 순계분리법
- ② 계통분리법
- ③ 모계선발법
- ④ 영양계선발법

31. 품종퇴화의 원인 중에서 유전적 퇴화에 해당되는 것만을 나 열한 것은?

- ① 병리적 퇴화, 자연교잡, 돌연변이
- ② 생리적 퇴화, 자연교잡, 돌연변이
- **③** 이형유전자분리, 자연교잡, 돌연변이
- ④ 생리적 퇴화, 병리적 퇴화, 돌연변이

32. 절단 전정을 하면 결실이 되지 않는 과수는?

- 라. 밤
- ② 복숭아, 사과
- ③ 자두, 서양배
- ④ 포도, 사과

33. 양적 형질을 지배하는 요인이 아닌 것은?

- ① 동의 유전자
- ② 미동 유전자
- 3 세포질 유전자
- ④ 환경

34. 잡종강세에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1 잡종강세 현상은 후대에 정확히 유전된다.
- ② 양친의 어느 것보다도 왕성한 생활양상을 볼 수 있다.
- ③ 잡종강세 식물은 대부분 개화기와 성숙기가 촉진된다.
- ④ 잡종식물은 외계의 불량환경 조건에 저항성이 강하다.

35. 자가불화합성 작물에서 불화합이 일어나는 조합은?

- \bigcirc S2S3 \times S1S2
- 2 S1S1 × S2S2
- ③ S1S2 × S3S3
- **4** S1S2 × S1S1

36. 다음 중 타가수정만을 행하는 작물은?

- ① 보리
- ② 담배
- ❸ 시금치
- ④ 토마토

37. 육종기술의 체계화 3단계 순서가 옳은 것은?

- ① 변이의 선택과 고정 → 변이의 탐구와 창성 → 신종의 증식과 보급
- ② 변이의 탐구와 창성 → 신종의 증식과 보급 → 변이의 선택과 고정
- ③ 변이의 선택과 고정 \rightarrow 신종의 증식과 보급 \rightarrow 변이의 탐구와 창성
- 변이의 탐구와 창성 → 변이의 선택과 고정 → 신종의 증식과 보급

38. 고정된 품종의 특성을 유지하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 영양번식
- ② 격리재배

- ③ 원원종 재배
- 4 교잡
- 39. 재래 품종을 대상으로 하여 내동성을 목표로 육종하려면 어떤 육종 방법을 채택하는 것이 좋은가?
 - ❶ 분리육종법
- ② 영양잡종법
- ③ 여교잡법
- ④ 배수성이용법
- 40. 재배 또는 이용상 동일한 특성을 나타내며, 동일한 단위로 취급되는 것이 편의상 좋은 개체군에 대하여 주어진 명칭 은?
 - ① 계통
- 2 품종
- ③ 종
- ④ 아종

3과목: 재배원론

- 41. 시비한 다음 토양 중에서 식물 뿌리의 흡수작용이나 미생물 의 작용에 영향을 미치는 생리적 산성비료는?
 - ① 석회질소
- ② 황산암모니아
- ③ 용성인비
- ④ 질산암모니아
- 42. 벼가 냉해를 받아 화분방출과 수정이 저해되었을 때, 이를 어떤 종류의 냉해라고 하는가?
 - ① 지연형 냉해
- ② 병해형 냉해
- 3 장해형 냉해
- ④ 복합형 냉해
- 43. 다음 중 간작(사이짓기)의 형태로 가장 적합한 것은?
 - 맥류 콩

- ② 목화 참깨
- ③ 수박밭 옥수수
- ④ 콩밭 수수
- 44. 모관수(capillary water)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 표면장력에 의해서 중력에 저항하여 보유되는 수분이다.
 - ❷ 흡습수라고도 한다.
 - ③ 작물이 주로 이용하는 유효수분이다.
 - ④ pF 2.7 ~ 4.5이다.
- 45. 씨 없는 포도를 유기하는데 가장 적합한 호르몬은?
 - GA(gibberellin)
- 2 Auxin
- ③ Ethlene
- 4 Kinetin
- 46. 다음 수해에 관여하는 요인 중 작물적 요인이 아닌 것은?
 - ① 작물의 종류
- 2 수온 및 수질
- ③ 작물의 생육단계
- ④ 작물의 품종
- 47. 저온이나 장일을 대체하여 화성을 유도, 촉진하는 호르몬 은?
 - 1) ABA
- 2 지베렐린
- ③ 사이토카이닌
- ④ 에틸렌
- 48. 춘화처리의 농업적 이용으로 가장 옳은 것은?
 - ❶ 채종상의 이용
- ② 춘파맥류의 추파 가능
- ③ 내비성의 증대
- ④ 출수개화의 지연
- 49. 고추, 벼(조생종), 메밀, 토마토 등은 식물의 일장감응 9형 중 어디에 속하는가?
 - ① LL형
- **②** II형
- ③ SS형
- ④ LS형

- 50. 온도와 광포화점과의 설명으로 옳은 것은?
 - ① 광포화점은 온도와 이산화탄소 농도에 따라 변하지 않는다.
 - ② 생육적온까지 온도가 높아질수록 광합성 속도는 높아지 나 광포화점은 낮아진다.
 - ③ 냉량한 지대보다는 온난한 지대에서 더욱 강한 일사가 요망된다.
 - ④ 대체로 일반식물의 광포화점은 전광의 80~100%이다.
- 51. 다음 병충해 방제 중 경종적 방제법이 아닌 것은?
 - ① 윤작에 의한 방제
 - ② 담수처리에 의한 방제
 - ③ 혼식에 의한 방제
 - ④ 생육기 조절에 의한 방제
- 52. 다음 작부방식 중 가장 일찍 실시되었던 농법은?
 - ① 휴한농법

- 2 이동경작
- ③ 개량 삼포식농법
- ④ 자유 경작법
- 53. 벼의 일생 중 냉해에 가장 약한 시기는?
 - ① 유수형성기
- 2 감수분열기
- ③ 출수개화기
- ④ 유숙기
- 54. 강산성 토양엥서 용해도가 증대되어 뿌리의 신장을 억제하는 원소는?
 - Al
- ② Mg
- ③ Fe
- (4) B
- 55. 사료작물을 용도에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?
 - ❶ 예취용
- ② 청예용
- ③ 사일리지용
- ④ 건초용
- 56. 다음 중 작물의 원산지를 추정하는데 유전자 중심설을 제창한 학자는?
 - ${\color{red} \mathbb{1}} \; \mathsf{DARWIN}$
- 2 VAVILOV
- 3 De CANDOLLE
- 4 MENDEL
- 57. 다음 중 추락저항성이 요구되는 작물은?
 - **●** #
- ② 콩
- ③ 王도
- ④ 사과
- 58. 다음 중 블라스토콜린이 의미하는 것은?
 - ① 춘화처리 대체물질
- 2 발아억제물질
- ③ 개화호르몬
- ④ 유수발육 촉진물질
- 59. 비료의 행동을 정확하게 추적할 수 있는 방사성동위 원소는?
 - ① ¹¹C, ¹⁴C
 - ② 60CO, 24NA
 - **3**²P, ⁴²K
 - 4 ¹³⁷Cs, ³⁵S
- 60. 다음 중 지온의 상승효과가 가장 적은 멀치 필름은?
 - 백색필름
- ② 흑색필름

- ③ 녹색필름
- ④ 투명필름

4과목: 식물보호학

61. 작물 생육에서 잡초 발생에 의한 피해가 아닌 것은?

- ① 경합해
- ② 상호대립억제작용
- ⑤ 토양침식
- ④ 병해충의 매개

62. A유재 40% 중 1000배로 희석하여 10a 당 150L를 살포하 려 할 때 A 유제 원액의 소요 약량은?

- ① 100mg
- 2 100mL
- **3** 150mL
- (4) 1500mL

63. 다음 중 세균병에 해당하는 것은?

- ❶ 벼 흰잎마름병
- ② 무 사마귀병
- ③ 오이 모자이크병
- ④ 보리 겉깜부기병

64. 해충발생 밀도 조사와 거리가 먼 것은?

- ① 예찰 등에 의한 조사
- ② 약제방제에 의한 조사
- ③ 포충망에 의한 조사
- ④ 성 페르몬에 의한 조사

65. 다음 중 바이러스 병에 진단법으로 틀린 것은?

- ① 지표식물에 접종하여 병징을 비교한다.
- ② 광학 현미경으로 바이러스 입자를 직접 관찰하여 모양으로 비교한다.
- ③ 혈청학적 방법을 이용한다.
- ④ PCR을 이용한다.

66. 기주체 세포벽 물질을 분해하기 위한 병원균의 효소가 아닌 것은?

- ① cutinase
- 2 pectinase
- g peroxidase
- (4) cellulase

67. 논에서 주로 많이 발생하는 잡초는?

- ❶ 물달개비
- ② 바랭이
- ③ 쇠뜨기
- ④ 망초

68. 고추의 최대 병해로서 방제하지 않으면 큰 피해를 가져오는 병해로만 나열된 곳은?

- ① 역병, 탄저병
- ② 흰가루병, 노균병
- ③ 무름병, 덩굴마름병
- ④ 붉은별무늬병, 시들음병

69. 식물검역상에서 가장 경계해야 할 병은?

- ① 토양전염성 병해
- ② 공기전염성 병해
- ③ 수매전염성 병해
- 4 종묘전염성 병해

70. 작물의 피해원인을 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분할 때 비생물적 요소에 해당되는 것은?

- ❶ 한해, 냉해에 의한 피해
- ② 올미 잡초에 의한 피해
- ③ 진딧물에 의한 피해

④ 오이 모자이크 바이러스에 의한 피해

71. 곤충 목(目)에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 노린재목의 앞 날개의 밑부분은 혁질화되어 있다.
- ② 매미목은 불완전변태를 하며, 양성생식 또는 단위 생식을 한다.
- 딱정벌레목은 완전변태를 하며, 곤충 중에서 나비목 다음으로 많은 종수를 가지고 있다.
- ④ 나비목에는 많은 종류의 농업 해충의 포함되어 있고, 유 충은 씹는 입틀을 가지고 있다.

72. 곤충 피부 중에서 외부골격으로서의 역할보다는 수분의 증발을 억제하는 기능으로서 가장 중요한 표피는?

- 1 외표피
- ② 원표피
- ③ 기저막
- ④ 진피

73. 농약의 반감기간이 몇 일 이상일 때 토양잔류성 농약이라 하는가?

- ① 60일 이상
- 2 180일 이상
- ③ 270일 이상
- ④ 360일 이상

74. 다음 중 광조건에 따른 잡초 발아성의 분류 중 암발아 잡초 종자는?

- ① 왕바랭이
- ② 향부자
- ③ 쇠비름
- 4 광대나물

75. 냉수온탕침지법을 이용해서 방제가 이루어지고 있는 병은?

- ① 밀 붉은 녹병
- ② 감자 잎말림병
- 보리 겉깜부기병
- ④ 사과나무 부란병

76. 다음 중 항생제 계통의 농약은?

- ❶ 아바멕틴 유제(올스타)
- ② 아시트 수화제(바이엘오트란)
- ③ 아조포 유제(호스타치온)
- ④ 아진포 수화제(구사치온)

77. 여치, 귀뚜라미, 땅강아지 등이 속하는 곤충 목은?

- ① 매미목
- ② 사마귀목
- ③ 노린재목
- ◑ 메뚜기목

78. 감자 역병에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Streptomyces scabies에 의해서 발생한다.
- ② 기온이 30℃ 이상이 되면 포장에서 병원균은 더 이상 생활 활동을 할 수 없다.
- ③ 감자 역병균에는 많은 레이스가 있으며 감자 괴경에서 균사체로 월동한다.
- ④ 포장저항성 품종을 재배하는 것이 기본적인 방제법 중의 하나이다.

79. 병원체의 전염원 능력 (inoculum potential)에 직접적으로 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

- ① 병원체의 수
- ② 가용 영양원의 량
- ③ 병원체 주위의 환경
- 4 기주 특이성

80. 다음 중 비래 해충으로 맞는 것은?

- ① 애멸구
- ❷ 벼멸구

● 2007년 03월 04일 필기 기출문제 ●

③ 끝동매미충

④ 번개매미충

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	3	3	3	3	3	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	4	1	2	1	3	2	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	2	1	1	2	3	1	3	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	3	1	4	3	4	4	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	3	1	2	1	2	2	1	2	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	2	2	1	1	2	1	2	3	2
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
3	3	1	2	2	3	1	1	4	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3	1	2	4	3	1	4	1	4	2