1과목: 과목 구분 없음

- 1. 작물의 개량에 기여한 사람과 그의 학설을 바르게 연결한 것 은?
 - ① C.R. Darwin 용불용설
 - ② T.H. Morgan 순계설
 - **③** G.J. Mendel-유전법칙
 - ④ W.L. Johannsen 돌연변이설
- 2. 토양이 산성화되었을 때 양분 가급도가 감소되어 작물생육에 불이익을 주는 것으로만 짝지은 것은?
 - 1 B. Fe. Mn
- B. Ca. P
- 3 Al, Cu, Zn
- 4 Ca, Cu, P
- 3. 작물의 종류에 따른 수확 방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 화곡류는 예취한다. ② 고구마는 굴취한다.
 - ③ 무는 발취한다.
- 4 목초는 적취한다.
- 4. 저장고 내부의 산소 농도를 낮추기 위해 이산화탄소 농도를 높여 농산물의 저장성을 향상시키는 방법은?
 - ① 큐어링저장
- ② 예냉저장
- ③ 건조저장
- 4 CA저장
- 5. 유효적산온도(GDD)를 계산하기 위한 식은?
 - GDD(℃) = ∑{(일최고기온 + 일최저기온)÷2 + 기본온도}
 - ② GDD(°C)=∑{(일최고기온+일최저기온)×2-기본온도}
 - ③ GDD(℃) = ∑{(일최고기온 + 일최저기온)÷2 기본온도}
 - ④ GDD(°C) = ∑{(일최고기온 + 일최저기온)×2 + 기본온도}
- 6. 토양미생물에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 토양미생물에서 분비되는 점질물질은 토양입단의 형성을 촉진한다.
 - ② 토양에 분포되어 있는 미생물 중 방선균의 수가 세균의 수보다 많다.
 - ③ 토양미생물인 균근은 인산흡수를 도와주는 대표적인 공생 미생물이다.
 - ④ 토양미생물 간의 길항작용은 토양전염 병원균의 활동을 억제한다.
- 7. 작물의 수확 및 출하 시기 조절을 위한 환경 처리 요인이 다 른 것은?
 - ① 포인세티아:차광재배
- ② 국화:촉성재배
- 3 딸기:촉성재배
- ④ 깻잎:가을철 시설재배
- 8. 작물의 생육단계가 영양생장에서 생식생장으로 전환되는 현 상에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 줄기의 유관속 일부를 절단하면 절단된 윗부분의 C/N율 이 낮아져 화아분화가 촉진된다.
 - ② 뿌리에서 생성된 개화유도물질인 플로리겐이 줄기의 생장 점으로 이동되어 화성이 유도된다.
 - 3 저온처리를 받지 않은 양배추는 화성이 유도되지 않으므 로 추대가 억제된다.
 - ④ 화학적 방법으로 화성을 유도하는 경우에 ABA는 저온· 장일 조건을 대체하는 효과가 크다.
- 9. 안티센스(anti-sense) RNA에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세포질에서 단백질로 번역되는 mRNA와 서열이 상보적인 단일가닥 RNA이다.
- ② mRNA와 이중나선을 형성하여 mRNA의 번역 효율을 높인
- ③ 특정한 유전자의 발현을 증가시켜 농작물의 상품가치를 높이는 데 활용될 수 있다.
- ④ 특정한 유전자의 DNA와 상보적으로 결합하여 전사 활성 을 높인다.
- 10. 영양번식작물의 유전적 특성과 육종방법에 대한 설명으로
 - ① 이형접합형 품종을 자가수정하여 얻은 실생묘는 유전자 형이 분리되지 않는다.
 - ② 이형접합형 품종을 영양번식시켜 얻은 영양계는 유전자 형이 분리된다.
 - ③ 영양번식작물은 영양번식과 유성생식이 가능하며, 영양 계는 이형접합성이 낮다.
 - ♪ 고구마와 같은 영양번식작물은 감수분열 때 다가염색체 를 형성하므로 불임률이 높다.
- 11. 테트라졸륨법을 이용하여 벼와 콩의 종자 발아력을 간이검 정할 때, TTC 용액의 적정 농도는?
 - ① 벼는 0.1%이고, 콩은 0.5%이다.
 - ② 벼는 0.1%이고, 콩은 1.0%이다.
 - ❸ 벼는 0.5%이고, 콩은 1.0%이다.
 - ④ 벼는 1.0%이고, 콩은 0.1%이다.
- 12. 경실종자의 휴면타파를 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 진한황산처리를 한다.
 - ② 건열처리를 한다.
 - 항사선처리를 한다.
 - ④ 종피파상법을 실시한다.
- 13. 중복수정 준비가 완료된 배낭에는 몇 개의 반수체핵(haploid nucleus)이 존재하며, 이들 중에서 몇 개가 웅핵(정세포)과 융합되는가? (순서대로 배낭의 반수체핵 수,웅핵과 융합되는 반수체핵 수)
 - 1 6, 2

2 6, 3

③ 8. 2

4 8. 3

- 14. 종・속간 교잡에서 나타나는 생식격리장벽을 극복하기 위해 사용되는 방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 자방을 적출하여 배양한다.
 - ② 약을 적출하여 배양한다.
 - ③ 배를 적출하여 배양한다.
 - ④ 배주를 적출하여 배양한다.
- 15. 요소의 엽면시비 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 1 보리와 옥수수에서는 화아분화 촉진 효과가 있다.
 - ② 사과와 딸기에서는 과실비대 효과가 있다.
 - ③ 화훼류에서는 엽색 및 화색이 선명해지는 효과가 있다.
 - ④ 배추와 무에서는 수확량 증대 효과가 있다.
- 16. 이식의 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 토지이용효율을 증대시켜 농업 경영을 집약화할 수 있 다.

- ② 채소는 경엽의 도장이 억제되고 생육이 양호해져 숙기가 빨라진다.
- ③ 육묘과정에서 가식 후 정식하면 새로운 잔뿌리가 밀생하 여 활착이 촉진된다.
- ① 당근 같은 직근계 채소는 어릴 때 이식하면 정식 후 근 계의 발육이 좋아진다.

17. 인공종자의 캡슐재료로 가장 많이 이용되는 화학물질은?

- ① 파라핀
- 2 알긴산
- ③ 비닐알콜
- ④ 소듐아자이드

18. 합성품종에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 격리포장에서 자연수분 또는 인공수분으로 육성될 수 있다.
- ② 세대가 진전되어도 비교적 높은 잡종강세가 나타난다.
- ③ 영양번식이 가능한 타식성 사료작물에 널리 이용된다.
- 유전적 배경이 협소하여 환경 변동에 대한 안정성이 낮다

19. 농업용수의 수질 오염과 등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 눈에 유기물 함량이 높은 폐수가 유입되면 혐기조건에서 메탄가스 등이 발생하여 토양의 산화환원전위가 높아진 다.
- ② 산성 물질의 공장폐수가 논에 유입되면 벼의 줄기와 잎 이 황변되고 토양 중 알루미늄이 용출되어 피해를 입는 다.
- ③ 수질은 대장균수와 pH 등이 참작되어 여러 등급으로 구 분되며 일반적으로 수온이 높아질수록 용존 산소량은 낮 아진다.
- ④ 화학적 산소요구량은 유기물이 화학적으로 산화되는 데 필요한 산소량으로서 오탁유기물의 양을 ppm으로 나타 낸다.

20. 유기농업은 친환경농업의 한 유형으로 실시되고 있다. 그 내용에 해당하지 않는 것은?

- ❶ 토양분석에 따른 화학비료의 정밀 시용
- ② 작부체계 내 두과작물의 재배
- ③ 병해충 저항성 작물 품종의 이용
- ④ 윤작에 의한 토양 비옥도 개선

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	4	4	3	2	3	3	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	4	2	1	4	2	4	1	1