

1과목 : 심리학개론

1. 아들러가 인간의 성격을 설명하면서 강조하지 않은 부분은?

- ① 열등감의 보상      ② 우월성 추구  
③ 힘에 대한 의지      ④ 신경증 욕구

2. 프로이드의 남근기와 관련이 없는 것은?

- ① 3세에서 6세 사이      ② 거세불안  
③ 동일시를 통한 극복 노력      ④ 자아성장의 결정적 단계

3. 주변에 교통사고를 당한 사람들이 많은 사람은 교통사고 발생률을 실제보다 높게 판단하는 것처럼 특정사건을 지지하는 사례들이 기억에 저장되어 있는 정도에 따라 사건의 발생가능성을 판단하는 경향은?

- ① 초두 효과      ② 점화 효과  
③ 가용성 발견법      ④ 대표성 발견법

4. Thorndike가 제시한 효과의 법칙(law of effect)과 관련이 없는 것은?

- ① 고전적 조건 형성      ② 도구적 조건 형성  
③ 시행착오 학습      ④ 문제상자(puzzle box)

5. 조작적 조건화의 강화스케줄 중에서 소거에 대한 저항이 가장 큰 강화스케줄은?

- ① 고정간격 강화스케줄      ② 변화간격 강화스케줄  
③ 고정비율 강화스케줄      ④ 변동비율 강화스케줄

6. 태도의 3요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 인지적 요소      ② 평가적 요소  
③ 귀인적 요소      ④ 행동적 요소

7. 다음 중 동조현상이 가장 적게 발생하는 상황은?

- ① 타인에게 자신이 잘 모르던 정보를 제공받는 경우  
② 개인의 주관이나 확신이 강한 경우  
③ 다수의 인정을 받으려는 동기가 높은 경우  
④ 이탈에 대한 집단압력이 부담스러운 경우

8. 피아제(Piaget)의 인지발달단계에서 감각운동기 동안에 발달하는 중요한 능력은?

- ① 보존개념      ② 추상적 사고와 추리  
③ 형식적 조작      ④ 대상 영속성

9. 잘 생긴 사람을 보면 그 사람이 성격도 좋고 리더쉽도 있을 것으로 생각하는 경향은?

- ① 후광효과      ② 초두효과  
③ 평균원리      ④ 귀인

10. Erickson의 발달 단계에서 마지막 8단계에 해당되는 노년기를 특징지우는 위기 혹은 해결해야 되는 과제는?

- ① 친밀감 대 고립감      ② 통합감 대 절망감  
③ 생산감과 자기 몰임      ④ 근면감 대 열등감

11. 다음 중 요인분석을 통하여 표면특질과 원치특질을 밝혀내고 16개의 성격요인을 검사하는 질문지를 개발한 사람은?

- ① C. Spearman      ② G. W. Allport  
③ R. Cattell      ④ J. Piaget

12. 우울증과 어떤 행동사이의 관련성을 살펴보기 위하여 피어슨의 상관계수(r)를 다음과 같이 얻었다고 가정할 때 다음 중 상관의 정도가 가장 큰 것은?

- ①  $r = 0.00$       ②  $r = 0.50$   
③  $r = 1.50$       ④  $r = -0.70$

13. 물속에서 기억한 내용을 물속에서 회상시킨 경우가 물 밖에서 회상시킨 경우에 비해서 회상이 잘된다. 이것은 무슨 효과인가?

- ① 인출단서효과      ② 맥락효과  
③ 기분효과      ④ 도식효과

14. 부모나 친구 혹은 영화배우 등의 행동을 본뜬으로써 학습하게 되는 것은?

- ① 역조건형성      ② 고전적 조건형성  
③ 조작적 조건형성      ④ 관찰학습

15. 인간의 발달과 관련된 연구결과를 이해하는데 있어 동시대 집단효과(cohort effect)를 고려해야 하는 연구법은?

- ① 종단적 연구법      ② 횡단적 연구법  
③ 자연관찰 연구법      ④ 참여관찰 연구법

16. 사람들은 대체로 외부귀인보다는 내부귀인하는 경향이 더 강하다고 할때 이것을 무엇이라고 하는가?

- ① 근본 귀인오류      ② 자기고양 편파  
③ 행위자 귀인편파      ④ 경양 편파

17. 소거(Extinction)가 영구적인 망각이 아니라는 증거가 될 수 있는 것은?

- ① 자극 일반화(Stimulus generalization)  
② 변별(Discrimination)  
③ 조형(Shaping)  
④ 자발적 회복(Spontaneous)

18. Watson이 실시한 Albert의 공포 형성 실험이 주는 시사점이 아닌 것은?

- ① 행동과 성격은 학습의 결과이다.  
② 성격은 개인의 잠재적인 기질이다.  
③ 자극의 일반화 현상이 작용한다.  
④ 성격의 변화도 역시 학습이다.

19. "KB-MKB-SMB-C5.1-66.2-9"라는 배열을 외우기는 힘들지만 이것을 IBM-KBS-MBC-5.16-6.29"라는 배열로 재구성하면 외우기가 쉽다. 이와 같이 정보를 재부호화 하여 묶는 것을?

- ① 암송      ② 부호화  
③ 청킹(Chunking)      ④ 합리화

20. 재혼에 방해가 되는 아들을 죽이고 싶은 욕망을 가진 어머니가 아들을 병적으로 끔찍하게 사랑하는 경우를 가장 잘 설명하는 방어기제는?

- ① 투사      ② 반동형성  
③ 승화      ④ 합리화

2과목 : 이상심리학

21. 다음 중 DSM-IV의 유아기, 아동기 및 청소년기에 처음 진단되는 장애에 속하지 않는 것은?  
 ① 운동기술장애                      ② 강박장애  
 ③ 품행장애                          ④ 학습장애
22. 다음 중 자기애적 성격장애(narcissistic personality Disorder)의 특징을 바르게 설명한 것은?  
 ① 타인회피, 부끄러움, 무관심  
 ② 다양하며 모호한 신체증상 호소  
 ③ 자기중심, 성공에 대한 환상  
 ④ 자기확신의 결여, 고독에 대한 불안감
23. 고졸인 30대의 김씨는 사기 혐의로 교도소에 여러번 다녀왔으나 부끄러운 줄 모르고 죄책감도 없다. 초등학교때 남의 집에 불을 지르기도 했고 무단 결석을 자주 했었다. 겉으로는 멀쩡하고 정신병적인 행동도 없다. 김씨의 이러한 성격과 관련된 요인으로 확인해야 할 것으로 포함되지 않는 것은?  
 ① 소아기에 신경학적 증후없이 중추신경계에 기능장애만 발생하였는지 여부  
 ② 테스토스테론(testosterone) 호르몬의 수치가 정상수준인지 여부  
 ③ 부모의 성격이 파괴적이거나 변덕스럽고 충동적이어서 노골적인 증오심과 거부애 발달에 일관성 있는 초자아발달에 지장이 있었는지 여부  
 ④ 부모의 질병, 별거, 이혼 또는 거부감정이 있어서 기본적으로 요구되는 사랑, 안전, 안정 및 존경심에 문제가 있었는지 여부
24. 다음 중 반사회적 성격장애의 증상으로 보기 어려운 것은?  
 ① 법이나 사회적 규범을 준수하지 않는다.  
 ② 개인의 이익이나 쾌락을 위한 거짓말이 반복된다.  
 ③ 충동성 혹은 미리 계획을 세우지 못한다.  
 ④ 대인관계를 실제보다 더 친밀한 것으로 생각한다.
25. 다음 중 자폐증의 임상적 특징이 아닌 것은?  
 ① 사회적 및 정서적 교류의 결핍  
 ② 음성언어의 지체나 결여  
 ③ 상동적인 신체운동  
 ④ 감각입력의 장애
26. 스트레스 호르몬이라고 불리는 코티솔(cortisol)이 분비되는 곳은?  
 ① 부신                                  ② 대뇌피질  
 ③ 변연계                                ④ 해마
27. 아동 및 청소년기 장애로서, 다른 사람의 기본 권리나 나이에 적합한 사회규준이나 규율을 위반하는 행동양상이 반복적이고 지속적으로 나타나는 것은?  
 ① 품행장애                          ② 반항성장애  
 ③ 반사회성 성격장애              ④ 주의력결핍 및 과잉행동장애
28. 강간, 폭행, 교통사고, 자연재해, 가족이나 친구의 죽음 등 충격적 사건에 뒤따른 심리적 장애는?  
 ① 주요 우울증                      ② 공황장애  
 ③ 외상 후 스트레스 장애              ④ 강박장애

29. 알콜중독의 취약요인에 대한 정신역동적 입장은?  
 ① 알콜이 스트레스를 해소하는 강화작용을 하는 것이다.  
 ② 구강기에 고착되어 있다.  
 ③ 알콜 의존환자의 자녀 가운데 알콜 의존인 경우가 많다.  
 ④ 공동체의 가치가 음주를 남성다움의 증거로 여긴다.
30. 28세의 남자 B씨는 경찰에 의해 검진을 받기 위해 병원 응급실에 실려왔다. 그는 말도 하지 않았고 이상한 자세로 자신의 팔을 등 쪽으로 벌리고 누워 있었다. B씨의 팔을 움직여 놓으면 그 자세로 고정되어 있었다. B씨는 어떤 장애인가?  
 ① 충동조작 장애                      ② 긴장형 정신분열증  
 ③ 이인증 장애                          ④ 감별불능형 정신분열증
31. 섬망과 치매에 관한 설명으로 올바른 것은?  
 ① 섬망의 필수증상은 이미 존재하거나 현재 진행중인 치매로 잘 설명되는 인지변화가 동반되는 의식장애이다.  
 ② 치매는 단지 노화에 의한 뇌세포의 손상으로 발병한다.  
 ③ 섬망은 단기간에 발생하는 의식장애와 인지변화가 특징이다.  
 ④ 치매는 심한 기억력장애만 나타날 뿐 복합적인 인지결손은 나타나지 않는다.
32. 다음 중 조증삽화의 진단기준을 만족시키기 위해 필요한 기분 문제가 아닌 것은?  
 ① 고양감                                  ② 우울감  
 ③ 확장감                                  ④ 자극과민성
33. 55세의 A씨는 알콜 중독으로 입원 이틀째에 혼돈, 망상, 환각, 진전, 초조, 불면, 발한 등의 증상을 보였다. A씨의 현 증상은?  
 ① 알콜로 인한 금단 증상이다.  
 ② 알콜로 인한 중독 증상이다.  
 ③ 알콜을 까맣게 잊어버리는(black out) 증상이다.  
 ④ 알콜로 인한 치매 증상이다.
34. 단극성 우울증과 양극성 장애에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 단극성 우울증은 양극성 장애에 비해 발병 나이가 빠른 경향이 있다.  
 ② 양극성 장애는 리튬이라는 약물에 더 잘 반응한다.  
 ③ 단극성 우울증은 양극성 장애에 비해 여성에게 더 많이 발생한다.  
 ④ 단극성 우울증은 불면증이 많은 반면 양극성 장애에서는 과다수면증(더 많은 잠을 잠)이 많다.
35. 다음 중 알코올 남용의 진단 기준이 아닌 것은?  
 ① 음주로 인해 학업과 직무수행에 장애를 겪는다.  
 ② 신체적으로 유해한 환경에서 알코올을 사용한다.  
 ③ 알코올 사용과 관련하여 내성과 금단 증후군이 나타난다.  
 ④ 지속적인 알코올 섭취로 인해 심각한 사회적 문제가 발생하고 있음에도 불구하고 지속적으로 알코올을 섭취한다.
36. 정신지체에 대한 설명으로 맞는 것은?  
 ① 읽기, 쓰기, 셈하기 장애를 보이는 학습장애의 다른 용어

- 이다.
- ② 경도(mild) 정신지체는 대략 IQ 25이하를 의미하며 전반적인 지원을 필요로 하는 정신지체를 말한다.
- ③ 정신지체는 일생에 걸쳐 언제든지 나타날 수 있다.
- ④ 일부 정신지체는 의학적 발견으로 예방이 가능하다.
37. 영숙은 자주 불안하다는 생각을 하곤 했으며 가족들과 다투고 나면 온 몸이 쭈서곤 했다. 어느 날 방안에 누워있는데 천장에 걸려있는 전등이 자신에게 떨어지면 큰일이라는 생각이 들었고 실제로 전등이 자신의 배 위로 떨어진다는 상상을 했다. 그런데 웬일인지 배 밑의 신체부분에 감각을 잃게 되었고 움직일 수 없었다. 병원을 찾았으나 신체적 원인을 발견하지 못했다. 가장 가능성이 높은 진단은?
- ① 건강염려증                      ② 전환장애
- ③ 신체화장애                      ④ 신체변형장애
38. 사람이 스트레스 장면에 처하게 되면 일차적으로 불안해지고 그 장면을 통제할 수 없게 되면 우울해진다고 할 때 이를 설명하는 모델은?
- ① 학습된 무기력감 모델                      ② 강화감소 모델
- ③ 인지 모델                      ④ 정신분석 모델
39. 알츠하이머 질환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 알츠하이머 환자는 호전적이거나 공격적 행동은 하지 않는다.
- ② 정상인의 뇌보다 알츠하이머 환자의 뇌에서는 아세틸콜린 세포의 상실이 발견된다.
- ③ 알츠하이머 질환은 가족력이 있고 남성보다 여성에게 빈번하게 나타난다.
- ④ 알츠하이머 질환은 완치될 수 있는 질환이 아니다.
40. 행동이 퇴행적이고 망상의 내용은 기이하며 인격의 황폐화가 가장 심한 정신분열병의 유형은?
- ① 와해형(Disorganized type)                      ② 긴장형(Catatonic type)
- ③ 망상형(Paranoid type)                      ④ 잔류형(Residual type)

3과목 : 심리검사

41. 정신과에 입원한 환자에게 MMPI를 실시하려고 한다. MMPI를 제대로 실시할 수 있는지 여부를 확인하기 위하여 알아보아야 할 사항으로 맞지 않는 것은?
- ① 지능수준                      ② 신체장애
- ③ 연령                      ④ 독해력
42. 다음 중 베일리 검사(Bayley Scales of Infant Development- II Assessment)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① Mental Scale, Motor Scale, behavior Rating Scale로 구성되어 있다.
- ② BSID- II에서는 대상 연령이 1개월에서 42개월 까지 확대되었다.
- ③ 표준자료를 제시하고 있다.
- ④ 전 생애에 걸친 발달 과정을 평가할 수 있다.
43. 웨슬러 지능검사는 언어성 6개, 동작성 5개 소검사로 구성되어 있다. 다음 중 언어성 검사에 해당하는 소검사는?
- ① 차례맞추기                      ② 숫자외우기
- ③ 바껴쓰기                      ④ 모양맞추기

44. MMPI검사의 임상척도의 하나인 심기증척도(Hs)의 설명으로 맞는 것은?
- ① 사소한 신체적, 심적 증상을 의식하고는 이에 과도하게 집착하고 불안해 하는 지표이다.
- ② 검사항목은 60개이다.
- ③ 현실적 어려움이나 갈등을 회피하는 방법으로 부인기제를 사용하는 경향 및 정도를 측정한다.
- ④ H척도가 높은 사람은 심한 정신적 압박을 받으면 자신의 욕구를 무의식적으로 신체적 증상으로 전환시키는 경향이 강하다.
45. 30세된 남자가 운전을 하다가 중앙선을 침범한 차량과 충돌하여 두뇌손상을 입었다. 이후 환자는 매사 의욕이 없고 할 수 있는대로 불구하고 어떤 행동을 시작하려고 하지 않으며, 계획을 세우거나 실천하는 것이 거의 안된다고 한다. 이 환자는 뇌의 어떤 부위가 손상되었을 가능성이 큰가?
- ① 측두엽                      ② 후두엽
- ③ 전두엽                      ④ 소뇌
46. 성격유형검사(MBTI)의 실시와 해석에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 피검자가 이해하지 못하는 문항이 있으면 그 문항의 해석, 설명을 꼭 해주어야 한다.
- ② 내적인 혼란상태에 있는 정신장애인들에게는 부적합하다.
- ③ 이 검사는 후천적 선호성을 알려주는 척도이기 때문에 정상적인 성격유형을 밝히는데는 부적절하다.
- ④ 특정한 조건(예, 입사시험)에서 검사를 받는 경우에는 안정적인 결과가 나올 수 있다.
47. 다음 중 동일한 검사를 동일한 피검자 집단에 일정 시간 간격을 두고 두 번 실시하여 얻은 두 검사 점수의 상관계수에 의하여 신뢰도를 측정하는 방법은?
- ① 동형검사 신뢰도                      ② 재검사 신뢰도
- ③ 반분검사 신뢰도                      ④ 문항 내적 일관성 신뢰도
48. 지능에 관한 일반적인 정의로 적합하지 않은 것은?
- ① 지능이란 학습능력이다.
- ② 지능이란 적응력이다.
- ③ 지능은 총합적 · 전체적이다.
- ④ 지능이란 단순한 사고능력이다.
49. 다음 중 객관적 성격 검사의 단점이 아닌 것은?
- ① 신뢰도, 타당도를 검증하기가 어렵다
- ② 피검자가 자신의 의견을 자유롭게 표현할 수 없다.
- ③ 사회적 바람직성 요인에 의해 영향을 많이 받는다.
- ④ 무의식적 요인을 평가하기 어렵다.
50. 여러 지역의 아동을 대상으로 학업성취도 검사를 하였다. 그 유용성에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?
- ① 특정 교육목표가 목표한 기능을 향상시켰는가를 확인한다.
- ② 한 아동이 영역별로 학업성취도의 편차를 보이는지 알아본다.
- ③ 초등학교 입학전이나 유치원 기간동안 실시하여 선별검사로 사용한다.
- ④ 지역별로 학업성취정도가 차이가 있는지 비교한다.

51. 집단용 지능검사의 특징으로 옳은 것은?

- ① 개인용 검사에 비해 지적 기능을 보다 신뢰성 있게 파악할 수 있다.
- ② 실시와 채점, 해석이 간편하다.
- ③ 개인용 검사에 비해 임상적인 유용성이 높다.
- ④ 선별검사(screening test)로 사용하기에는 적합하지 않다.

52. 심리검사에서 원점수란 실시한 심리검사를 채점해서 얻는 최초의 점수를 말한다. 이 원점수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원점수는 그 자체로는 거의 아무런 정보를 주지 못한다.
- ② 원점수는 기준점이 없기 때문에 특정 점수의 크기를 표현하기 어렵다.
- ③ 원점수는 척도의 종류로 볼 때 등간척도에 불과할 뿐 사실상 서열척도가 아니다.
- ④ 원점수는 서로 다른 검사의 결과를 동등하게 비교할 수 없다.

53. Bannatyne 의 분류에 따르면 웨슬러 지능검사는 4가지 범주(언어적 개념화, 공간적 능력, 연속적 능력, 획득된 지식)으로 분류될 수 있다. 지능은 우수하지만 근본적으로 주의력결핍장애가 있어 학업부진을 보이는 아동이나 청소년들이 가장 낮은 점수를 보이는 범주와 그 범주에 속하는 소검사들이 바르게 짝지어진 것은?

- ① 획득된 지식 - 기본지식, 산수문제, 어휘문제
- ② 연속적 능력 - 산수문제, 숫자문제, 차례맞추기
- ③ 연속적 능력 - 산수문제, 숫자문제, 바퀴쓰기
- ④ 획득된 지식 - 기본지식, 산수문제, 이해문제

54. 23개월 유아가 월령에 비해 체격이 작고 아직도 걷는 것이 안정적이지 않으며, 말할 수 있는 단어가 "엄마, 아빠"로 제한되었다는 내용을 주 증상으로 내원하였다. 이 유아에게 실시할 수 있는 검사로 적합한 것은?

- ① 그림지능검사      ② 유아용 지능검사
- ③ 덴버 발달검사      ④ 뻘아제식 지능검사

55. 다음 중 검사가 측정하고자 하는 속성을 제대로 측정하였는지를 논리적 사고에 입각한 논리적 분석과정을 통해 주관적으로 판단하는 타당도는?

- ① 공인 타당도      ② 구인 타당도
- ③ 내용 타당도      ④ 예측 타당도

56. 신경심리검사는 고정식(fixed), 융통식(flexible) 바테리 접근이 있는데, 두 접근의 장단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정식 바테리 접근은 임상장면에서 동일한 검사의 많은 자료가 자동적으로 축적됨에 따라 임상과 연구의 목적이 함께 충족될 수 있다.
- ② 고정식 바테리 접근은 급속히 발전하는 신경심리학의 연구결과에 맞추어 검사방법을 변경시킬 수 없다는 것이 단점이다.
- ③ 융통식 바테리 접근은 기본검사에서 전반적인 기능이 정상으로 나오면 필요한 검사만을 선택적으로 실시할 수 있다.
- ④ 융통식 바테리 접근은 고정식 바테리 접근과는 달리 해석상의 기준이나 지침이 제시되기 때문에 검사자의 전문성이 덜 요구된다.

57. 구성능력을 평가하는데 적절한 신경검사는?

- ① 추적검사(Trial Making Test)
- ② Boston 실어증검사
- ③ Rey 복잡도형검사(Complex Figure Test)
- ④ 위스콘신 카드검사

58. 다음 중 Wechsler 계열의 지능 검사를 나이가 어린 대상에게 실시하는 것부터 차례로 배열한 것은?

- ① WAIS-R → WPPSI-R → WISC-III
- ② WPPSI-R → WISC-III → WAIS-R
- ③ WISC-III → WAIS-R → WPPSI-R
- ④ WPPSI-R → WAIS-R → WISC-III

59. 검사해석 시 자주 사용하는 T점수는 z 점수와 밀접한 관련이 있다. T점수가 60이라면 이에 해당하는 z 점수는?

- ① 0      ② 1
- ③ 2      ④ -1

60. 바쁜 부모를 대신하여 방과 후 중풍에 걸린 할머니를 돌보던 여학생이 갑자기 오른손 마비 증상을 보여서 신경과를 방문하여 진찰을 받았으나, 신경학적 검사에서는 모두 정상 소견을 보였다. 정신과로 자문이 의뢰되어 MMPI를 실시한 결과 1-3번 척도가 가장 높게 상승하였고, 2번 척도는 3번 척도보다 매우 낮았다. 가능한 진단명은?

- ① 신체화 장애      ② 전환 장애
- ③ 경련성 장애      ④ 외상 후 스트레스 장애

4과목 : 임상심리학

61. 다음 중 Boulder 모델에서 제시한 임상심리학자의 주요 역할을 가장 잘 열거한 것은?

- ① 치료, 평가, 자문      ② 치료, 평가, 연구
- ③ 치료, 평가, 행정      ④ 평가, 교육, 행정

62. ABAB 설계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① AB 또는 ABA 로 변형이 가능하다.
- ② 한번에 두개 이상의 처치효과를 비교한다.
- ③ 통제집단에 대한 처치가 보류되는 문제가 있다.
- ④ 철회되지 않는 학습과제의 경우 적용이 어렵다.

63. 최초로 임상심리학이라는 용어를 사용하였고, 또 최초로 심리진료소를 개설한 임상심리학의 원조는?

- ① 분트(W. Wundt)      ② 위트머(L. Witmer)
- ③ 프로이트(S. Freud)      ④ 로저스(C. Rogers)

64. 운동기능이나 감각식별 과제로 구성된 심리검사의 신뢰도는 적합하나, 추리력 및 독창성을 측정하는 심리검사의 신뢰도로 적합하지 못한 것은?

- ① 재검사 신뢰도      ② 동형검사 신뢰도
- ③ 반분신뢰도      ④ 내재일치도

65. 임상심리학자의 고유한 역할에 해당되지 않는 것은?

- ① 사례관리      ② 심리평가
- ③ 심리치료      ④ 심리학적 자문

66. 수련을 끝낸 임상심리 전문가들이 집단개업활동을 할 때 주의해야 할 사항은?

- ① 자기의 결정, 직업윤리, 활동에 대한 개인적인 책임
- ② 직업적인 경쟁과 성격적인 충돌 가능성
- ③ 독립적인 사무실의 확보 비용
- ④ 개인적이고 직업적인 고립감

67. 심리검사의 타당도(validity)의 의미로 알맞은 것은?

- A. 심리검사가 원래 측정하려고 하는 바를 측정했는지의 정도
- B. 심리검사 점수의 변동성의 정도
- C. 심리검사를 구성하는 내용의 적합성 정도
- D. 심리검사 점수의 정확도의 수준

- ① A. B                      ② A. C
- ③ B. D                      ④ B. C

68. 상담에서 해석의 제시형태로 적절하지 않은 것은?

- ① 확정적 표현              ② 점진적 전형
- ③ 반복적 전형              ④ 질문형태의 제시

69. 다음은 임상심리학자의 윤리기준 중 무엇을 의미하는가?

내담자나 타인에게 명백한 위험을 초래하게 되는 특별한 경우를 제외하고는 개인이나 개인의 법적인 대리인의 동의가 있을 때에만 타인에게 이러한 정보를 제공할 수 있다.

- ① 비밀보장의 원칙
- ② 소비자 복지의 원칙
- ③ 공적인 진술의 원칙
- ④ 인간피해를 대상으로 하는 연구에서의 원칙

70. 행동관찰의 잠재적인 문제에 해당되지 않는 것은?

- ① 관찰자의 신뢰도              ② 관찰자의 개입 가능성
- ③ 치료와의 직접적인 연관성      ④ 상황적 요소

71. 다음 중 심리치료에서 좋은 결과를 이끌어 내는 요인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 치료자의 온정과 공감
- ② 치료자와 내담자간의 치료적 동맹 관계
- ③ 문제에 대한 방어적 회피
- ④ 치료에 대한 내담자의 적절한 기대

72. 뇌의 편측성 효과를 탐색하는 방법은?

- ① 뇌파검사                      ② 동물외과술
- ③ 신경심리검사                  ④ 이원청취기법

73. 스트레스는 정신장애 뿐 만 아니라 신체적 질병의 발병, 진행과정, 그 예후에 영향을 준다. A형 성격의 사람은 일상생활에서 특히 스트레스를 많이 받는다고 알려져 있다. 이 A형 성격과 관련이 깊은 신체적 질병은?

- ① 관상동맥성 심장질환              ② 암
- ③ 위궤양                          ④ 본태성 고혈압

74. 다음 중 고전적 조건형성의 원리를 응용한 치료 기법은?

- ① 혐오치료                      ② 토근경제
- ③ 타임 아웃(TIME OUT)기법      ④ 부적 강화

75. 임상적 면접에서 사용되는 바람직한 의사소통 기술에 해당되는 것은?

- ① 면접자 자신의 사적인 이야기를 꺼내는데 주저하지 않는다.
- ② 침묵이 길어지지 않게 하기 위해, 면접자는 즉각 개입할 준비를 한다.
- ③ 폐쇄정보보다는 개방형 질문을 주로 사용한다.
- ④ 내담자의 감정보다는 얻고자 하는 정보에 주목한다.

76. 다음 중 접수면접의 주요목적이 아닌 것은?

- ① 환자를 병원이나 진료소에 의뢰할지 고려한다.
- ② 제공되는 서비스에 대한 환자의 질문에 대답 한다.
- ③ 치료자에게 신뢰, 래포 및 희망을 심어주려고 시도한다.
- ④ 환자가 자신이나 다른 사람을 해칠 중대한 위험상태에 있는지 결정한다.

77. 대표적인 지능검사인 Wechsler 성인 및 아동 지능검사를 대표하는 하위검사들에서 환산점수의 평균과 표준편차가 올바른 것은?

- ① 평균 100, 표준편차 15              ② 평균 10, 표준편차 5
- ③ 평균 50, 표준편차 10                  ④ 평균 10, 표준편차 3

78. 심리치료 과정에서 저항이 일어나는 일반적 이유가 아닌 것은?

- ① 환자가 변화를 원할지라도 환자의 삶에 중요한 영향을 미치는 타인들이 현 상태를 유지하도록 방해할 수 있기 때문이다.
- ② 부적응적 행동을 유지함으로써 얻는 이차적 이득을 환자가 포기하기 어렵기 때문이다.
- ③ 익숙한 행동을 변화시키려는 시도가 환자에게 위협을 주기 때문이다.
- ④ 치료자가 가진 가치나 태도가 환자에게 위협적이기 때문이다.

79. 만성적인 인지적 손상, 최근 사건에 대한 심각한 기억력 저하, 지남력 사실 등이 주된 특징이고, 오랫동안 심각한 수준의 음주를 한 사람이 나타내는 증후군은?

- ① Raynaud씨병                      ② Korsakoff 증후군
- ③ 알코올의존 증후군                  ④ 태아 알코올 증후군

80. 정신분열증으로 휴직을 하고 2년간 입원치료를 받아 증상이 완화된 교사가 복직을 하기 위해 정신과 외래를 방문하여 심리평가를 받았다. 이 교사가 자신에게 증상이 없음을 인정받기 위한 시도가 과도한 경우 MMPI에서 예상되는 타당도 척도들의 양상은?

- ① 정상범위에 있을 것이다.
- ② L, F, K 척도 모두 상승할 것이다.
- ③ L과 K척도가 높게 상승할 것이다.
- ④ F척도가 높게 상승할 것이다.

5과목 : 심리상담

81. 내담자가 심리상담실에 찾아와서 자신이 어떻게 행동해야

할지(예를 들면, 무슨 말을 해야하는지, 휴대폰을 어떻게 해야하는지, 오늘은 언제까지 심리상담이 진행되는 건지 등)를 모르고 불안해한다. 심리상담자가 무엇을 소홀히 하고 있기 때문인가?

- ① 수용                      ② 해석  
③ 구조화                  ④ 경청

82. 집단상담의 초기단계에서 다루어져야 할 주요 과제에 해당하지 않는 것은?

- ① 신뢰할 수 있는 분위기 조성  
② 집단의 저항 다루기  
③ 집단에 대한 두려움, 희망, 조건, 기대를 기꺼이 표현하기  
④ 집단규준을 마련하기

83. 체계적 둔감법(systematic desensitization)의 기초가 되는 학습원리는?

- ① 혐오 조건형성              ② 고전적 조건형성  
③ 조작적 조건형성          ④ 고차적 조건형성

84. 다음 중 정신역동적 상담기법의 핵심특징과 가장 거리가 먼 기법은?

- ① 공감적 경청              ② 자유연상  
③ 꿈의 해석                ④ 전이의 해석

85. 성폭력, 아동학대 피해자에게 그가 겪은 사건의 전말을 자세하게 녹음해서 지겹도록 두고두고 그 테이프를 듣게 한다면, 이는 어떤 상담기법인가?

- ① 노출                      ② 정보제공  
③ 직면                      ④ 반영

86. 전화상담에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 내담자의 말을 가로막지 않고 경청한다.  
② 내담자가 상담자를 신뢰할 수 있도록 상담자의 이름 등 개인신상을 자세히 공개한다.  
③ 상담자는 내담자가 감정을 발산할 수 있도록 허용해 준다.  
④ 내담자가 고맙다는 말을 할 때 “고맙다고 말씀하시니 저도 기쁩니다.”라고 반응한다.

87. 성폭력 피해자의 상담원리로서 부적절한 것은?

- ① 상담자 자신이 갖는 성폭력에 대한 편견을 자각하고 올바른 태도로 수정한다.  
② 위기상황에 있는 피해자의 상태를 수용하고 반영해주며 진지한 관심을 전달한다.  
③ 성폭력 피해가 내담자의 책임이 아니며, 가치가 손상된 것이 아님을 확신하도록 한다.  
④ 성폭력 피해자의 고통과 공포, 분노감을 되도록 단기에 치유하려고 시도한다.

88. 약물남용 청소년의 진단 및 평가에 있어서 상담자가 유의해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 청소년이 약물을 사용한 경험이 있다는 것만으로 약물남용자로 낙인찍지 않도록 한다.  
② 청소년 약물 남용과 관련해서 임상적으로 이중진단의 가능성이 높은 심리적 장애는 우울증, 품행장애, 주의결핍-과잉행동 장애, 자살 등이 있다.  
③ 청소년 약물남용자들은 약물사용 동기나 형태, 신체적

결과 등에서 성인과 다른 양상을 보이므로 DSM-IV와 같은 성인 위주 진단체계의 적용에 한계가 있다.

- ④ 약물남용이 일차적인가 이차적인가에 따라 우선적으로 개입해야 하는 상담목표가 달라지는데, 일차적 약물남용이란 가족문제나 학교 부적응 등의 관련요인들의 영향으로 인한 약물사용을 말한다.

89. 신체적 장애가 발생하는 경우 적응과정을 거치게 된다. 그 과정을 바르게 나열한 것은?

- |      |             |
|------|-------------|
| ① 적응 | ② 무울반응      |
| ③ 부정 | ④ 독립에 대한 저항 |
| ⑤ 충격 |             |

- ① ③→②→⑤→④→①      ② ⑤→③→②→④→①  
③ ②→⑤→③→①→④      ④ ⑤→②→③→①→④

90. 인터넷 중독의 상담전략 중 게임관련 책자, 쇼핑 책자, 포르노 사진 등 인터넷 사용을 생각하게 되는 단서를 가능한한 없애는 기법은?

- ① 자극 통제법              ② 정서 조절법  
③ 공간재활용법          ④ 인지재구조화법

91. 정신분석적 심리치료에서 치료목표를 달성하기 위한 가장 강력한 수단은?

- ① 전이                      ② 역전이  
③ 꿈 분석                ④ 자유연상

92. 다음 중 행동치료 기법으로 분류되지 않은 것은?

- ① 강화                      ② 모델링(modeling)  
③ 홍수요법                ④ 반영

93. 효과적인 전화상담을 위해 상담자가 활용할 수 있는 기본적인 방법들에 속하지 않는 것은?

- ① 성실한 경청              ② 공감적 이해의 전달  
③ 즉각적 개입 및 문제해결      ④ 전이 반응을 좌절시킴

94. 자살방지센터(suicide prevent centers)에서 긴급한 자살 상황에 처한 사람으로부터 걸려온 전화를 받는 자원봉사자의 행동요령은?

- ① 점검표(check list)를 앞에 놓고, 전화를 건 사람에게 자세한 질문을 던진다.  
② 자살동기를 물어서는 안된다.  
③ 자살계획을 털어놓을 때까지 기다려야 한다.  
④ 자살하지 말라고 지시한다.

95. AA(Alcoholic Anonymous)에서 이루어지는 활동의 대표적인 특징은?

- ① 알코올 중독 치료 후에 사교적인 음주를 허용함  
② 술이나 중독물의 부작용을 생생하게 상상하고 논의함  
③ 술 중독을 병으로 인정하고 단주를 목표로 함  
④ 술과 함께 심한 부작용을 일으키는 혐오적 약물을 치료함

96. 우울한 사람들이 보이는 체계적인 사고의 오류 중 결론을 지지하는 증거가 없거나 결론과 배치되는데도 불구하고 어떤 결론을 이끌어 내는 과정을 의미하는 인지적 오류는?

- ① 선택적 추상화(selective abstraction)

- ② 과일반화(overgeneralization)
- ③ 개인화(personalization)
- ④ 임의적 추론(arbitrary inference)

97. 청소년의 자아개념 향상을 위한 상담전략이 아닌 것은?

- ① 청소년 자신의 능력과 중요성에 대한 자각
- ② 자기국가주의와 문화적 우월주의
- ③ 대인관계 기술
- ④ 자기이해 및 표현능력

98. 인지적 결정론에 따른 치료적 접근과 입장이 다른 것은?

- ① 합리적 정서치료      ② 점진적 이완훈련
- ③ 인지치료              ④ 자기교습 훈련

99. 가족상담에 대한 맥매스터 모델에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 가족기능을 8가지 측면에서 고려한다.
- ② 정서적 관여는 다섯 가지로 분류한다.
- ③ 정서적 반응 내용에 대해 두 가지 질문을 한다.
- ④ 행동통제 기능은 네 가지 유형으로 분류한다.

100. 인터넷 상담의 장점으로 가장 적합한 것은?

- ① 래포(rapport) 형성이 쉽다.
- ② 내담자의 정보를 얻기 쉽다.
- ③ 상담 공간과 시간이 융이하다.
- ④ 상담과정이 원활하다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	①	④	③	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	④	②	①	④	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	④	④	①	①	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	①	③	④	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	①	③	②	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	③	④	③	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	①	①	②	②	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	①	③	④	④	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	②	①	①	②	④	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	①	③	④	②	②	①	③