



- ② 독립변수의 조작
  - ③ 비동질 통제집단의 설정
  - ④ 실험집단과 통제집단에 대한 무작위 할당
16. 가설검증을 위한 유의수준을 0.01 대신 0.05로 설정하였을 때의 설명으로 옳은 것은?
- ① 1종 오류의 위험이 증가한다.
  - ② 2종 오류의 위험이 증가한다.
  - ③ 1종 오류, 2종 오류 모두의 위험이 증가한다.
  - ④ 1종 오류, 2종 오류 모두의 위험이 감소한다.
17. 편차점수의 속성과 관계가 없는 항목은
- ① 특정한 사례가 평균으로부터 떨어져 있는 유클리드 직선 거리이다.
  - ② 원 변인에서 상수인 평균을 빼서 선형변환한 점수이다.
  - ③ 원 변인의 편차점수 간 상관은 0이다
  - ④ 원 변인의 편차점수들의 합은 0이다.
18. 요인분석에서 고유치(eigenvalue)에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 요인에서 각 측정변수로의 표준화 회귀계수
  - ② 한 종속변수에 대한 여러 독립변수들의 설명량
  - ③ 전체 측정변수의 분산에서 각 요인이 설명하는 분산 정도
  - ④ 각 측정변수의 분산에서 추출된 요인들이 설명하는 분산 정도
19. 가설설정 시 유의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 가설은 가치중립적인 성질을 띠어야 한다.
  - ② 가설의 조작적 정의는 추상적인 성질을 띤다.
  - ③ 가설은 항상 실증적으로 검증이 가능해야 한다.
  - ④ 가설은 구체적인 성질의 것이어야 하며 그 뜻이 명확하여야 한다.
20. 우울증을 측정하기 위해 새로 개발한 검사가 기존의 불안증 검사와 상관이 낮은 것으로 나타났다면 이 검사는 어떤 종류의 타당도가 높은 것인가?
- ① 안면 타당도                      ② 수렴 타당도
  - ③ 변별 타당도                      ④ 예언 타당도

**2과목 : 고급이상심리학**

21. DSM-5에서 다음의 증상에 가장 적합한 진단은?
- 3주 전 10대 후반의 여자 청소년이 남자친구의 오토바이를 함께 타고 가다가 자동차와 부딪쳐 남자친구는 사망하고 자신은 가벼운 찰과상을 입게 되었다 그녀는 2주 만에 병원에서 퇴원 하였으나 사고가 반복되는 악몽과 두통, 사고 장면이 순간순간 떠오르는 증상, 자동차와 오토바이에 대한 극심한 불안을 주 호소하며 심리치료센터에 방문하였다.
- ① 급성 스트레스 장애(acute stress disorder)
  - ② 반응성 애착장애(reactive attachment disorder)

- ③ 외상 후 스트레스 장애(Posttraumatic stress disorder)
  - ④ 적응 장애(adjustment disorder)
22. 아동 청소년기에 흔한 심리장애에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 분리불안장애는 집이나 애착 대상과의 분리에 대한 과도한 공포와 불안이다.
  - ② 반응성 애착장애는 생후 9개월부터 만 5세 이전의 아동에게 주로 발생한다.
  - ③ 선택적 무언증은 증상이 1개월 이상 지속되는 경우이다.
  - ④ 만성 틱장애는 증상이 연속적으로 6개월 이상 지속되는 경우이다.
23. DSM 진단체계에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① DSM보다 앞서 정신장애를 진단하는 체계가 있었다.
  - ② DSM-2부터 다축 분류를 채택하였다.
  - ③ 정신지체는 DSM-4의 2축으로 분류된다.
  - ④ DSM-5에서 DSM-4에서 적용되었던 다축진단체계가 폐기되었다.
24. DSM-5에서 적응장애에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 분명히 확인될 수 있는 심리사회적 스트레스 사건에 대한 반응으로 부적응 증상이 나타나야 한다.
  - ② 청소년의 경우 비행 행동이 나타날 수 있다.
  - ③ 우울 및 불안 등 정서적인 어려움을 보인다.
  - ④ 적응장애를 지닌 아동은 흔히 인지발달과 언어발달이 늦어지거나 상동적 행동문제를 나타낸다.
25. DSM-5에서 파괴적, 충동통제 및 품행장애의 특징을 짚지 않은 것은?

ㄱ. 정서와 행동에 대한 자기통제 문제와 관련된다.  
 ㄴ. 타인의 권리를 침해하거나 사회적 규범을 위반하는 부적응적 행동들이 여기에 포함된다.  
 ㄷ. DSM-5에서 적대적 반항장애, 병적 방화, 반사회성 성격장애 등을 포함한다.  
 ㄹ. 대개 성인기에 발병한다.  
 ㅁ. 충동 행동 후회 결과를 통해 새로운 학습이 일어나 충동행동은 자연스럽게 점점 줄어든다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ                      ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
  - ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ                      ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
26. 정신분석이론에서 강박성 성격장애와 관련된다고 보는 심리 성적 발달단계는?
- ① 구강기                              ② 항문기
  - ③ 남근기                              ④ 성기기
27. 다음 증상에 가장 적합한 진단은?
- A씨는 어떤 성취를 하여도 언제나 다음 목표를 세워야 하며 즐겁지가 않다. 휴가를 가서도 일할 거리를 가지고 가기 때문에 가족과 함께 시간을 보내기가 어렵다.
- ① 의존성 성격장애                      ② 편집성 성격장애

- ③ 강박성 성격장애    ④ 회피성 성격장애

28. DSM-5에서 성기능부전(Sexual Dysfunction)에 해당하지 않는 것은?

- ① 성별 불쾌감(Gender Dysphoria)
- ② 조기사정(Premature Ejaculation)
- ③ 발기장애(Erectile Disorder)
- ④ 여성극치감장애(Female Orgasmic Disorder)

29. Clark의 인지이론에서 공황발작을 유발하는 핵심적 요인은?

- ① 신체 감각에 대한 파국적 오해석
- ② 자신에 대한 부정적이고 역기능적인 신념
- ③ 공황발작 상황에 대한 학습된 무기력감
- ④ 불안유발 상황에 대한 부적절한 방어기제

30. DSM-5에서 성격장애에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① B군 성격장애는 정서적, 극적인 성격 특성을 나타낸다.
- ② 반사회성 성격장애는 아동기 및 청소년기에 진단되며, 10세 이전에 품행장애를 나타낸 증거가 있어야 한다.
- ③ 반사회성 성격장애와 자기애성 성격장애는 타인의 감정과 욕구에 대한 공감 능력 결여가 공통된 특징이다.
- ④ 경계선 성격장애와 기분장애가 함께 나타날 때 자살 가능성이 높아진다.

31. 이상행동 및 정신장애의 판별기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주관적 불편감과 개인적 고통    ② 법적 규제
- ③ 적응적 기능의 저하 및 손상    ④ 문화적 규범의 이탈

32. Bandura의 사회적 학습 이론에 근거해 이상행동의 형성 혹은 치료를 설명한 예는?

- ① A군은 주인공이 각종 범죄를 저지르며 부자로 성공하는 영화를 시청한 후 이를 모방한 범죄를 저질렀다.
- ② B양이 백화점에서 큰 소리로 울고 때를 쓸 때마다 어머니는 B양을 진정시키기 위해 장난감을 사 주었다.
- ③ 야뇨증을 보이는 C군에게 이불이 젖을 때마다 시끄럽게 울리는 부지를 설치하여 소변을 보도록 하였다.
- ④ D양은 수업시간에 돌아다니지 않으면 선생님께 스티커를 한 장씩 받고 10장을 모으면 햄버거를 선물 받았다.

33. DSM-5의 신경인지장애에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 주요 신경인지장애(major neurocognitive disorder)는 2가지 이상의 인지적 영역에서 과거의 수행 수준에 비해 심각한 인지적 저하가 나타나는 경우를 말한다.
- ② 경도 신경인지장애(minor neurocognitive disorder)는 인지적 저하로 인해서 일상생활을 독립적으로 영위할 수 있는 능력이 없는 경우를 말한다.
- ③ DSM-4에서 치매(dementia)로 지칭되었던 장애가 DSM-5에서는 그 심각도에 따라 경도 또는 주요 신경인지장애로 지칭되고 있다.
- ④ 섬망(delirium)은 의식이 혼미해지고 주의집중 및 전환능력이 현저하게 감소하지만 기억, 언어, 현실판단 등의 인지기능에는 장애가 나타나지 않는 경우를 말한다.

34. 양극성 장애의 치료에 가장 적합한 행동은?

- ① 리튬 카보네이트(Lithium carbonate)
- ② 플록세틴(fluxetine)

- ③ 벤조다이아제핀(benzodiazepine)
- ④ 알프라졸람(alprazolam)

35. 본드, 시너 등 휘발성 흡입제의 중독 증상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 현기증    ② 불분명한 언어
- ③ 운동조정 곤란    ④ 근육강직

36. 급식 및 섭식장애(feeding and eating disorders)의 특성을 모두 고른 것은?

ㄱ. 신체기능의 저하를 가져와 죽음에까지 이를 수 있다.  
 ㄴ. 날씬한 것에 대해 선호하는 사회문화적 분위기와 관련된다.  
 ㄷ. 외모를 중시하는 직업군에서 발병률이 높다.  
 ㄹ. 대체적으로 20대 중 후반에 발병한다.  
 ㅁ. 신경성 폭식증은 정상체중을 유지한다는 점에서 신경성 식욕부진증과 다르다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ    ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ    ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

37. DSM-5에서 다음 사례에 가장 적합한 진단명은?

10년째 사법고시를 준비하고 있는 K는 친구없이 늘 혼자 지내며 30대 중반의 나이에도 불구하고 여자나 결혼에 대해 전혀 관심이 없다. 어려서부터 부모에게도 거리감을 느껴 가까이 하지 않았고 타인과 친밀한 관계를 원하지도 않았다. 외모에 신경을 쓰지 않아 타인에게 이상한 사람으로 여겨지나 타인의 비판에 무관심하다. 정서적으로도 냉담하며 고립되어 고시촌에서 단조롭고 메마른 생활을 하고 있다.

- ① 조현성 성격장애    ② 회피성 성격장애
- ③ 조현형 성격장애    ④ 자기애성 성격장애

38. DSM-5에서 조현병의 특성을 모두 고른 것은?

ㄱ. 망상, 환각, 혼란스러운 언어를 특징으로 하는 심각한 정신장애  
 ㄴ. 장애가 진행되고 있다는 징후가 최소 6개월이상 지속  
 ㄷ. 심하게 혼란스러운 행동이나 긴장증적 행동  
 ㄹ. 장애가 물질이나 다른 신체적 질병의 생리적 효과에 의한 것이 아님

- ① ㄱ, ㄴ    ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ    ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

39. 우울증에 대한 Seligman의 학습된 무기력 이론에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정적 강화의 결핍과 혐오적 불쾌 경험 증가에 의한 우울 유발 효과
- ② 반응과 결과 간의 반복적인 무관성 경험의 우울 유발 효과

과

- ③ 상황에 대한 통제 불가능 경험의 우울 유발 효과
- ④ 회피 및 도피조건 형성 패러다임에 근거하여 설명된 개념

40. DSM-5에서 다음 설명에 가장 적합한 진단은?

- 비명을 지르거나 울면서 갑자기 일어난다.  
 소아에서 시작되고 청소년기 동안  
 - 자연적으로 해소된다.  
 - 다음 날 아침에 깨면 전날 밤 사건을 기억하지 못한다.

- ① 악몽장애(nightmare disorder)
- ② 야경증형(sleep terror type)
- ③ 기면증(narcolepsy)
- ④ 수면보행유형(sleepwalking type)

**3과목 : 고급심리검사**

41. 시각-공간 구성능력과 가장 밀접한 관련이 있는 검사는?

- ① Wechsler 지능검사의 토막짜기 검사
- ② 손가락 두드리기 검사(Finger Tapping Test)
- ③ 위스콘신 카드분류검사(Wisconsin Card Sorting Test)
- ④ 스트룹 검사(STROOP Test)

42. 내적합치도를 확인할 수 있는 신뢰도 지수들로 짝지어진 것은?

- ① 동형검사신뢰도와 KR-20      ② KR-20과 phi 계수
- ③ KR-21과 Cronbach  $\alpha$  계수      ④ 반분신뢰도와 phi 계수

43. 지능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Spearman에 의하면, 지능은 일반요인(g요인)과 특수요인(s요인)으로 구성되어 있다.
- ② Gardner의 다중지능이론에 따르면, 지능은 여러 개의 독립적인 영역으로 구성되어 있다.
- ③ Sternberg에 의하면, 지능의 3가지 측면은 분석적 지능, 창의적 지능, 그리고 실용적 지능이다.
- ④ Wechsler에 의하면, 지능은 주변 환경을 효과적으로 처리해 나가는 영역별로 특수화된 지적 능력이다.

44. 아동용 심리검사에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① CAT는 아동의 인지발달을 평가하기 위해 개발되었다.
- ② BGT는 시각-운동협응의 발달을 평가할 수 있다.
- ③ HTP 검사에서 나무 그림은 사람그림보다 심층적 수준의 자기상을 반영하는 것으로 가정된다.
- ④ Rorschach 검사에서 적절한 부분반응이 가능해지는 시기는 6-7세경이다.

45. 심리검사를 위한 면담에서 유의할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내담자의 비언어적 행동뿐만 아니라 면담자 자신의 반응에 대해서도 의식하고 있어야 한다.
- ② 면담자는 눈 맞춤, 안면 표정, 언어적 비언어적 반응을 통해 내담자에 대한 관심을 표현해야 한다.
- ③ 내담자의 방어성은 “왜?”라는 이유를 묻는 질문을 통해

다루는 것이 권장된다.

- ④ 면담자는 면담이 끝나기 5-10분쯤 전에 남은 시간을 내담자에게 미리 알려줌으로써 시간을 준수하도록 도와주어야 한다.

46. Rorschach 검사의 반응을 기호화할 때 포함하는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반응위치                      ② 결정인
- ③ 반응순서                      ④ 반응내용

47. MMPI-2에서 프로파일의 무효 가능성을 판별하는 데 사용되는 기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 무응답 문항의 개수가 20개 이상
- ② VRIN 척도 혹은 TRIN 척도의 T 점수가 하나라도 80 이상
- ③ 비임상적 장면에서 F 척도의 T 점수가 80 이상
- ④ Fp 척도의 T 점수가 100 이상

48. MMPI-2에서 수검자가 모두 ‘그렇다’라고 응답했을 때 상승하는 척도를 묶은 것은?

- ① VRIN 척도 TRIN 척도                      ② TRIN 척도 F 척도
- ③ VRIN 척도 Sc 척도                      ④ TRIN 척도 Hy 척도

49. 심리검사 보고서 작성 요령에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 평가 목적은 정확하고 문제 지향적인 방식으로 언급한다.
- ② 평가절차에는 실시된 검사의 종류, 구조화된 면담의 종류, 면담시간을 포함한다.
- ③ 행동관찰을 기술할 때 구체적 행동에 대한 임상가의 추론을 반영하여야 한다.
- ④ 법적인 보고서에는 검사 점수를 포함시킨다.

50. Rotter가 제시한 것으로, 주제통각검사(TAT) 해석 시 검토해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 우세한 정서는 무엇인가?
- ② 반복되는 주제는 무엇인가?
- ③ 통상적으로 사용되는 표현법은 무엇인가?
- ④ 성별을 다루는 양식은 어떠한가?

51. 심리검사 결과를 피검사자에게 전달할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 피검사자의 교육정도                      ② 피검사자의 문화적 배경
- ③ 피검사자의 정서적 반응                      ④ 피검사자의 경제적 반응

52. 아동 및 청소년의 발달적 성숙이나 기능에 대한 검사인 사회성숙도 검사에서는 6가지 영역에 대한 발달정도를 측정한다. 다음 중 6가지 영역에 해당하지 않는 것은?

- ① 자조(SH)                      ② 이동(L)
- ③ 의사소통(C)                      ④ 욕구(N)

53. MMPI에서 2/4, 4/2 상승척도 쌍에 관한 임상적 해석과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가족 문제, 법적 문제, 알코올 남용 등의 문제로 치료 장면을 찾는다.
- ② 자살 사고, 자살 시도 가능성이 높다.
- ③ 수동-의존적 성향이 강해 타인의 요구를 거절하지 못하

- 지만, 소소한 불평이 많다.
- ④ 자신의 문제 행동에 우울감, 죄책감을 보고하지만, 동일한 행동 문제가 반복된다.
54. 내용표집에 의해 오차변량이 발생하는 신뢰도 계수와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 검사-재검사 신뢰도 ② 동형검사 신뢰도  
 ③ 반분신뢰도 ④ 문항 내적 합치도
55. 신경심리검사 중 베타리형 검사와 개별검사의 특징에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 베타리형 검사의 단점은 일부 기능에 대해서는 필요 이상으로 자료를 제공하는 반면에 어떤 기능에 대해서는 불충분한 자료를 제공하게 된다.  
 ② 베타리형 검사를 시행하는 경우 신속하게 변화되고 있는 신경심리학적 연구 추세에 따라 평가방법을 변형할 수 있다.  
 ③ 개별검사는 기분검사에서 기능이 온전하게 평가되면 불필요한 검사를 시행하지 않아도 된다.  
 ④ 개별검사의 선택과 실시, 해석과정은 베타리형 검사보다 훈련과 경험에 있어서 고도의 전문성을 요구한다.
56. 심리검사의 실시와 채점과정에서 일관성(동일성)을 확보하는 과정으로 가장 적합한 것은?  
 ① 단일대상 검사 절차  
 ② 심리검사의 표준화  
 ③ 임상적 평가 절차  
 ④ 심리검사의 신뢰도와 타당도 검증
57. 진단적(diagnostic) 면담과 치료적(therapeutic) 면담에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 진단적 면담은 일상 진단을 내리기 위한 목적으로 진행 된다.  
 ② 진단적 면담은 상담장면에서는 내담자의 과거력을 수집하고 문제를 파악하여 적절한 상담자와 연결지어 주기 위한 접수 면담과 유사점이 있다.  
 ③ 전통적인 치료적 면담에서는 구조화된 방식이 우선시 된다.  
 ④ 치료적 면담은 보통 진단적 면담 이후에 이루어진다.
58. 운동성 가족화검사(KFD)에 대한 해석으로 가장 적합한 것은?  
 ① 특정인물 밑에 선을 긋는 것은 그 인물에 대한 호감을 나타낸다.  
 ② 우측에 그려진 인물은 내향성 및 참체성과 관련된다.  
 ③ 요지의 하단에 그려지는 인물은 가족 내 주도적인 인물을 나타낸다.  
 ④ 인물 간의 거리는 아동이 지각한 구성원 간의 친밀도나 심리적 거리로 해석된다.
59. Wechsler 지능검사의 소검사 중 다음 요인들과 가장 관련이 있는 것은?

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - 결정적 지능        | - 언어적 개념화     |
| - 사회적 판단력       | - 실제적, 실용적 지식 |
| - 과거 경험의 평가의 사용 |               |

- ① 기본지식 ② 어휘

- ③ 이해 ④ 공통성

60. MMPI-2가 개발된 이유와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① MMPI의 임상척도들이 현대의 진단기준과 불일치하기 때문이다.  
 ② MMPI의 문항 선정에서 사용된 예비문항의 폭이 좁아 임상가들이 중요하게 생각하는 성격특성을 충분히 반영되지 못했기 때문이다.  
 ③ 새로운 기준이 필요하기 때문이다.  
 ④ 시대에 어울리지 않거나 부자연스런, 그리고 남녀차별적인 문항들이 있기 때문이다.

**4과목 : 고급임상심리학**

61. 자신, 타인, 세상에 대한 '반드시 -해야한다(should or must)'는 식의 불합리한 요구를 정서적 스트레스와 행동적 문제의 원인으로 보고 이를 치료하려는 접근법을 제안한 학자는?  
 ① Beck ② Ellis  
 ③ Wolpe ④ Eysenck
62. 신경심리학 영역에서 사용하는 주요 검사와 주평가 영역에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① Rey-Osterrieth Complex Figure Test: 시공간적 기억의 평가, 즉각 회상과 지연 회상 등 포함  
 ② Wisconsin Card Sorting Test: 언어적 능력  
 ③ Purdue Pegboard Test: 정교한 시각-운동협응 능력  
 ④ Controlled Oral Word Association: 단어 유창성을 통한 전두엽 및 측두엽 기능 평가
63. 정신분석이론에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 정신결정론을 주장하며 무의식의 중요성을 강조한다.  
 ② 자아는 실행기능을 담당하며 현실원리에 따른다.  
 ③ 방어기제가 언제나 부적응적인 것은 아니다.  
 ④ 초자아는 도덕적 판단자로서 의식외로만 이루어져 있다.
64. 임상심리학자의 역할 중 하나인 자문에 대한 내용과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 고등학교 교장에게 회의시간에 자신에게 공개적으로 도전하는 교사에 대처하는 가장 좋은 방법에 대한 지침을 제공하는 것  
 ② 소아과 의료진들에게 청소년들이 병동에서 다른 환자와 성적인 문제를 일으키는 것을 줄이기 위한 프로그램을 개발해 주는 것  
 ③ 수많은 성격 갈등 때문에 비생산적이고 비효율적인 결과를 빚고 있는 어떤 회사의 팀 구성원들에게 서로 더 잘 지낼 수 있는 방법을 알려주는 것  
 ④ 내향적인 성격과 대인관계에 대한 두려움으로 인해 교우 관계에 어려움을 겪고 있는 학생을 대상으로 지속적인 개입을 제공하는 것
65. 임상심리학의 과학자-전문가 모델에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 진단, 치료, 연구 외에도 일반심리학, 행동의 정신역동, 인접 학문 분야의 교육과정이 강조된다.  
 ② Boulder 모델로 알려져 있으며, 박사학위 과정 취득을 요구한다.  
 ③ 임상심리학자는 일차적으로 심리학자이고 이후 임상가가

- 되어야 함을 강조하는 모델이다.
- ④ 1970년대 Vail 모델로 계승되어 과학과 임상 실습을 모두 포용하는 특징을 보인다.
66. MMPI 혹은 MMPI-2에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 타당도 척도는 수검자의 동기와 수검 태도에 대한 이해하는 수단을 제공한다.
- ② 보충 척도는 연구용이므로 해석에는 활용하지 않는다.
- ③ 상승한 척도 점수를 기반으로 해석하는 것은 과잉단순화의 오류 가능성이 높다.
- ④ MMPI와 MMPI-2를 통해 정신역동적인 미묘한 상호작용에 대한 정보를 얻기는 힘들다.
67. 법정심리학자의 영역과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 위험예측                      ② 아동양육권
- ③ 배심원 선정                  ④ 행정자문
68. 체계적 둔감화의 본질적인 치료 원리 및 정착과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 이완 훈련                      ② 역조건 형성
- ③ 도구적 조건형성              ④ 고전적 조건 형성
69. 연대별 한국의 주요 임상심리학적 사건에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 1960년대: 병원 장면에 진출하여 심리평가를 주로 담당함
- ② 1970년대: 한국심리학회로부터 임상심리전문가 자격규정 정식으로 인증받음
- ③ 1980년대: 정신요양원의 비인도적 처우 등을 개선하기 위하여 정신보건법을 제정함
- ④ 1990년대: 정신보건 임상심리사 등 임상심리학의 법적권위를 부여받음
70. Rorschach 검사의 지표에 대한 해석적 의미로 가장 적합한 것은?
- ① Zf=0: 자아를 성찰하는 내성적 활동과 연관된다.
- ② FD: 복잡한 인지적 책략을 사용하여 과제에 접근하는 정도를 나타낸다.
- ③ W:M의 비율: 자극상황을 전체적으로 다루려는 의욕 및 동기와 관련된다.
- ④ CONFAB: 환경에 대한 태도가 매우 비관적임을 나타낸다.
71. 행동적 접근 및 인지행동적 접근에서 주로 사용하는 치료기법과 증상에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 이완기법은 스트레스를 많이 경험하는 환자를 대상으로 하여 긴장된 스트레스 상황에서 긴장을 해결하기 위해 사용한다.
- ② 노출치료는 광장공포증이 있는 환자들에게 많은 사람들 앞에서 연설을 하도록 한다.
- ③ 자기주장훈련은 극심한 소극성을 가진 환자들을 대상으로 하여 다른 사람들에게 자신이 요구하는 바를 말하도록 한다.
- ④ 혐오치료는 인터넷 중독에 빠진 중학생을 대상으로 왜곡된 인지를 수정한다.
72. 치료성과와 관련 있을 것으로 일반적으로 생각되지만, 경험적으로 지지되지 않고 있는 환자-내담자 변인의 예와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 남성 내담자들이 더 나은 치료 성과를 얻을 것이다.
- ② 내담자의 나이가 많으면 치료 결과가 나쁠 것이다.
- ③ 동기수준이 높은 내담자만이 좋은 치료성과를 얻을 수 있을 것이다.
- ④ 사회경제적 지위가 높은 내담자들이 더 나은 치료 성과를 얻을 것이다.
73. 행동평가의 기본 입장에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 직접적 평가방법의 강조
- ② 개인의 내현적 주관적 측면을 강조
- ③ 행동은 현재의 결과보다 과거의 결과에 의해 지속됨
- ④ 행동의 기저 원인을 강조
74. 지역사회심리학의 핵심 개념 중 생태학적 분석 수준에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 개인 수준에서 지역사회 심리학자들은 개인과 환경간의 관계를 연구한다.
- ② 조직은 보다 큰 거시체계의 세트이다.
- ③ 미시체계는 개인이 가족, 친구, 동업자 등 타인과 함께 직접 참여하는 환경의 관계에 초점을 둔다.
- ④ 지역은 다양한 미시체계의 조직으로 이루어진다.
75. Type A 행동패턴을 가진 사람들의 특성과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 시간이 빨리 간다고 지각한다.
- ② 지연된 반응을 요구하는 과제에서 수행이 향상된다.
- ③ 좌절하면 공격적이고 적대적이 된다.
- ④ 피로감과 신체적 증상을 덜 보고한다.
76. 정신사회재활의 목표와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 환자의 정신병적 증상의 경감
- ② 환자의 사회적 기능 회복
- ③ 환자의 대인관계 기술 증진
- ④ 환자의 인지기능 향상
77. 치료계획 수립에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 치료계획 수립에서 참여, 협의는 환자에 대한 책임감을 가지고 있는 가족 및 전문가에 한해야 한다.
- ② 치료계획의 수립은 잠정적 가설이며 불변의 계획이 되어서는 안 된다.
- ③ 치료계획 수립에서 환자의 병리를 고려하여 치료자가 가장 적절한 계획을 세워 안내해주는 것이 바람직하다.
- ④ 치료계획 수립 시 치료자가 가지고 있는 접근법에 대한 설명을 해주는 것은 환자로 하여금 방어를 일으킬 수 있는 것이기 때문에 치료자의 접근법을 개방해서는 안 된다.
78. 위기면접에서의 면접자 태도로 적합한 것을 모두 고른 것은?



- ① 상담자가 효율적으로 사용하고 있는 기술
  - ② 상담자의 성격적 문제가 상담에 미치는 영향
  - ③ 상담자의 이론적 지식을 실제에 적용하는 능력
  - ④ 상담자 성장을 위한 상담자의 심리적인 외상경험
90. 노인 치매환자에 대한 일반적인 치료 접근방법과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 가족들에게 치매의 본질, 진단, 예후 등에 대한 교육을 제공하고 신체적 부담이나 정신적 고통을 토론하며 지지해 주는 가족치료가 도움이 된다.
  - ② 일단 치매가 시작되면 기억을 도울 수 있는 여러 가지 환경적 조치를 취한다 해도 효과적인 도움이 되지 못한다.
  - ③ 여러 가지 인지 과제를 통한 인지기능 훈련은 초기 치매환자의 증상개선에 도움이 된다.
  - ④ 치매 환자의 보호자에 대한 지역 사회의 정서적, 물리적 지원은 매우 중요하다.
91. 알코올 중독의 미네소타 치료모델에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 12단계 원리에 근거한 치료 작업을 포함하고 있다.
  - ② AA의 원리가 치료에 기본이 된다.
  - ③ 회복 중인 알코올, 약물 중독자가 상담을 제공한다.
  - ④ 낮 병원 중심의 프로그램이다.
92. 합리적 정서행동치료(REBT)에서 말하는 비합리적 사고 중 다음 내용과 관련된 것은?
- 나는 지금의 상황을 견딜 수 없다.  
 - 나는 그것 없이는 한시도 살 수 없다.  
 - 나는 일이 이렇게 된 것을 참을 수 없다.
- ① 좌절에 대한 낮은 인내성      ② 과잉일반화
  - ③ 자기비하      ④ 개인화
93. 현실치료의 특징에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 내담자가 보이는 증상에 대한 치료를 우선시해야 한다.
  - ② 내담자가 치료과정에서 보이는 전이현상을 충분히 경험해야 한다.
  - ③ 내담자가 대인관계를 '통제'하려는 것에서 벗어나도록 도와야 한다.
  - ④ 자신에게 일어나는 모든 일에 대하여 내담자가 책임지도록 도와야 한다.
94. 손상, 불능, 장애에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 손상이나 불능은 시간과 공간에 의해 제한된다.
  - ② 장애는 영구적인 것으로 절대적인 개인차가 존재한다.
  - ③ 시력에 문제가 있는 경우 상황에 따라 장애가 될 수도 있고 되지 않을 수도 있다.
  - ④ 인간이 능력있는 사람이 되느냐를 결정하는 것은 손상 또는 불능을 가지고 있는가 여부에 의해 결정된다.
95. 자기감찰(self-monitoring)에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 행동평가 혹은 인지행동평가 및 치료에서 주로 사용하는 방법이다.
  - ② 저항이 매우 적고 신뢰할 수 있는 자료 수집이 가능하다.

- ③ 역기능적 신념기록지 역시 자기감찰방법이다.
  - ④ 계산기나 초시계 등 도구를 사용하기도 한다.
96. 약물남용과 함께 정신장애를 갖고 있는 것으로 이중 진단된 내담자의 특성에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 약물 남용을 제외한 정신장애의 문제를 단독으로 가지고 있는 경우에 비해 훨씬 더 심각하고 만성적인 문제들을 경험한다.
  - ② 약물 사용을 중단하게 되면 정신 장애도 동시에 소멸된다.
  - ③ 재발률은 일반 약물중독자들에 비해 상대적으로 높은 편이다.
  - ④ 약물남용과 정신장애를 치료받을 수 있는 기회를 모두 제공하여야 한다.
97. 인간중심 치료에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 일치성은 치료자가 진실하고 통합되어 있고 솔직하다는 뜻이다.
  - ② 내담자를 한 인간으로서 진정하고 깊이 있게 관심을 가지되 이것은 무조건적이어야 한다.
  - ③ 치료자는 치료회기 동안 모든 상호작용에서 드러나는 경험과 감정을 민감하고 정확하게 이해하는 공감이 필요하다.
  - ④ 일치성, 무조건적 긍정적 관심, 공감적 이해는 연속적이라기보다는 실무용(all or none)적으로 존재한다.
98. 다음( )에 들어갈 용어로 알맞은 것은?
- 정신분석적 개입에서 개입의 궁극적 목적은 내담자가 자신의 문제에 대해 ( )을 얻게 도와주는 것이다.
- ① 통찰      ② 전이
  - ③ 역전이      ④ 카타르시스
99. 정신분열병 환자들의 인지 재활에 적용 가능한 기법을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 주의집중력 훈련      ㄴ. 기억 전략 훈련  
 ㄷ. 사회 인지 훈련      ㄹ. 정서 지각 훈련
- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
  - ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ      ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
100. 다음 사례에서 A양에게 읽기 이해력을 증진시키기 위한 개입으로 가장 적합한 것은?
- A양은 초등학교 4학년인데도 읽기 속도가 느리고 이해력도 부족하다. 어머니가 직접 가르치고 학원에도 보내봤지만 별로 소용이 없었다고 한다. 단 A양은 평균의 지능수준으로 평가되었다.
- ① 단어 하나하나에 집중하기보다는 덩어리나 군 단위로 읽도록 한다.
  - ② 읽기의 목적이 무엇인지 파악하도록 한다.
  - ③ 배경음악을 틀 상태에서 혼자서 읽도록 한다.
  - ④ 기본 시선을 문서의 중앙에 두도록 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	②	②	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	③	①	③	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	④	①	②	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	①	④	③	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	①	③	③	①	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	①	②	②	③	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	④	④	②	④	③	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	②	②	①	②	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	④	①	②	③	③	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	③	②	②	④	①	④	②